

# Manuel pour les agents vétérinaires communautaires

---



## [Table des matières](#)

---

**Guide pratique**  
**Recommandations aux moniteurs**  
**Principes directeurs pour l'adaptation**

**ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET**  
**L'AGRICULTURE**  
**Rome, 1995**

**Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aucune prise de position quant au statut juridique**

**des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.**

**M-27**

**ISBN 92-5-203258-4**

**Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système de recherche documentaire ni transmise sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit: électronique, mécanique, par photocopie ou autre, sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur. Toute demande d'autorisation devra être adressée au Directeur de la Division des publications, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie, et comporter des indications précises relatives à l'objet et à l'étendue de la reproduction.**

**© FAO 1995**

***Cette version numérique du document a été scannérisé en utilisant des logiciels de reconnaissance optique de texte (OCR) et en vérifiant manuellement et attentivement le texte. Bien que la digitalisation soit de haute qualité, la FAO décline toute responsabilité pour les éventuelles différences pouvant apparaître dans ce document par rapport à la version imprimée originale.***

---

**[Table des matières](#)**

---

**[Préface](#)**

## Introduction

### **Première partie: Guide pratique**

#### Chapitre 1: Les animaux et la communauté

Module 1: Pourquoi élevons-nous des animaux?

Module 2: Les animaux et l'environnement

#### Chapitre 2: L'organisme animal

Module 3: Les organes et les systèmes de l'organisme

Module 4: La température du corps

Module 5: Apparence extérieure (habitus) de l'animal sain

Module 6: Propagation de la maladie

#### Chapitre 3: Bovins, ovins, caprins et buffles

Module 7: Les ruminants

Module 8: La météorisation

Module 9: Comment déterminer l'âge des ovins, des caprins, des bovins et des buffles

Module 10: Contention des bovins et des buffles

Module 11: Le soin des pieds (sabots ou onglons)

Module 12: La tonte

Module 13: Décornage des veaux, des agneaux et des cabris

Module 14: La castration des ruminants

Module 15: Les parasites internes (endoparasites) des ruminants

**Module 16: Les parasites externes (ectoparasites) des ruminants**

**Module 17: Les signes de rut (chaleurs ou œstrus) chez les ruminants**

**Module 18: La gestation chez les ruminants**

**Module 19: Vêlage (parturition)**

**Module 20: Mise bas des agneaux et des cabris**

**Module 21: Soins au nouveau-né**

**Module 22: La production de lait et la mamelle**

**Module 23: L'affouragement et l'abreuvement des ruminants**

**Module 24: Aménagement des pâturages**

**Module 25: La peste bovine et la fièvre aphteuse**

#### **Chapitre 4: Le porc**

**Module 26: Manipulation et contention des porcs**

**Module 27: Le rognage des dents chez les jeunes porcs**

**Module 28: Les parasites internes des porcs**

**Module 29: Les infections cutanées des porcs**

**Module 30: Le rut (œstrus) chez la truie**

**Module 31: Gravidité et mise bas**

**Module 32: Soins à donner à la truie et au porcelet**

**Module 33: La castration des porcelets**

**Module 34: L'alimentation des porcs**

**Module 35: Le logement des porcs**

**Module 36: Marquage ou encoche à l'oreille (identification)**

#### **Chapitre 5: Chevaux, ânes et mulets**

**Module 37: Comment maîtriser les chevaux, les ânes et les mulets**

**Module 38: Comment déterminer l'âge des chevaux**

**Module 39: Soins des sabots (pieds), ferrure et boiterie**

**Module 40: La colique**

**Module 41: Les parasites internes des équidés**

**Module 42: Les affections de la peau et du pelage des équidés**

**Module 43: Rut (œstrus), accouplement et gestation**

**Module 44: Poulinage et soins aux jeunes animaux**

**Module 45: Ecurie et pâturage**

**Module 46: Le fourrage et l'eau pour les équidés**

**Module 47: Pansage et harnais**

**Module 48: La peste équine**

## **Chapitre 6: Poulets et canards**

**Module 49: L'élevage des poulets et des canards**

**Module 50: Le logement des poulets et des canards**

**Module 51: L'alimentation des poulets et des canards**

**Module 52: Problèmes dus à une alimentation déficiente**

**(carences)**

**Module 53: Incubateurs et couveuses**

**Module 54: La couvaision**

**Module 55: Les parasites internes des poulets et des canards**

**Module 56: Les parasites externes des poulets et des canards**

## **Chapitre 7: Chameaux, lamas et alpagas**

[Module 57: Chameaux, lamas et alpagas](#)

[Module 58: La détermination de l'âge du chameau d'après sa denture](#)

[Module 59: La reproduction chez le chameau](#)

[Module 60: La lactation et les soins au jeune chameau](#)

[Module 61: Alimentation et abreuvement des chameaux](#)

[Module 62: Le surra des chameaux \(trypanosomiase\)](#)

[Module 63: Les parasites internes des chameaux](#)

[Module 64: Les maladies cutanées des chameaux](#)

[Module 65: Les problèmes de pied chez les chameaux](#)

## [Chapitre 8: Le lapin](#)

[Module 66: L'élevage et l'alimentation des lapins](#)

[Module 67: Les problèmes de santé des lapins](#)

## [Chapitre 9: Le traitement des animaux malades en général](#)

[Module 68: Diarrhée et constipation](#)

[Module 69: Salivation et problèmes de la bouche](#)

[Module 70: La fièvre](#)

[Module 71: Toux et problèmes de respiration](#)

[Module 72: Les problèmes oculaires](#)

[Module 73: Plaies et hémorragies](#)

[Module 74: Fractures \(os cassés\)](#)

[Module 75: Les tumeurs sous la peau](#)

[Module 76: L'empoisonnement](#)

## Chapitre 10: La santé animale et la communauté

Module 77: La rage

Module 78: La tuberculose

Module 79: L'hydatidose

Module 80: La lucilie bouchère (ver à vis)

Module 81: La teigne

Module 82: Elimination des animaux morts

Module 83: Elimination des excréments

Module 84: La santé de la communauté

### Annexes

Annexe 1: Médicaments

Annexe 2: Outils (instruments) vétérinaires importants

Annexe 3: Techniques importantes

1. Stérilisation des instruments

2. Injections

3. Vaccinations

4. Administration d'un breuvage

5. Bols (grosses pilules)

6. Tubage gastrique

7. Nettoyage du pis

8. Prélèvement d'échantillons de sang

9. Comment faire des étalements sanguins

10. Prélèvement d'échantillons pour le laboratoire

**11. Comment recueillir des échantillons de matières fécales**

**12. Pulvérisation**

**13. Bain de déparasitage**

**14. Nœuds et mise au piquet**

**Annexe 4: Sélection des animaux pour la reproduction**

**Annexe 5: La tenue des registres**

**Annexe 6: Poids et mesures**

**Annexe 7: Lexique**

**Deuxième partie: Recommandations aux moniteurs**

**1. Créer les conditions propices à un bon apprentissage**

**Ce que doit faire le moniteur**

**Les conditions d'apprentissage**

**2. Evaluation des progrès accomplis par les stagiaires**

**Tâches simples et tâches complexes**

**Développement de l'aptitude du stagiaire à apprendre**

**Evaluation du travail des stagiaires et du succès du programme de formation**

**3. Les modules d'apprentissage**

**4. Exemples de plans de formation**



## Troisième partie: Principes directeurs pour l'adaptation de ce manuel

### 1. Introduction

### 2. La nécessité des soins vétérinaires communautaires

### 3. L'agent vétérinaire communautaire et la communauté

### 4. Le rôle des femmes dans les soins vétérinaires communautaires

### 5. Le groupe de travail

### 6. Adaptation du manuel

### 7. Le processus d'adaptation

### 8. La santé de la communauté

### 9. Qui utilise ce manuel?

### 10. Traduction



---

## Préface

**Les informations qui aident les gens à améliorer leur bien-être et leur environnement sont toujours les bienvenues. Le présent manuel contient de telles informations concernant la santé humaine ainsi que la production et la santé animales. Il a été rédigé à l'intention de ceux qui ont le plus besoin d'animaux productifs et en bonne santé, c'est-à-dire les éleveurs des régions rurales. Ces hommes et ces femmes ont de précieuses compétences et une expérience des animaux dont l'homme se nourrit. Le *Manuel pour les agents vétérinaires communautaires (AVC)* contient des informations pour les hommes et les femmes sur le terrain qui assurent dans chaque communauté des services de base pour la**

**santé et la production animales. Grâce à cet ouvrage, à une formation et à un minimum d'encadrement, les AVC pourront combler certaines lacunes dans le système de santé animale des pays en développement. Ces services créeront directement des emplois dans les zones rurales; ils sont simples, judicieux et durables.**

**Le manuel pour AVC est adapté du manuel de l'Organisation mondiale de la santé pour les agents de santé communautaires. L'adaptation est un thème important dans tout le manuel. Un livre ne peut pas contenir à lui seul des informations précises sur la santé et la production animales qui soient applicables dans le monde entier. Les sources d'affouragement et les herbages sont différents, la fréquence et l'importance des maladies sont variables et les noms que l'on donne aux remèdes pour animaux peuvent différer. Aussi le manuel donne-t-il aux moniteurs des orientations sur la façon d'adapter les informations aux diverses situations dans différentes localités.**

**Ce manuel est destiné à être utilisé constamment, et non à rester fermé sur une étagère. Des espaces sont prévus pour rédiger des notes et indiquer le nom des remèdes pour animaux disponibles localement. Les AVC sont encouragés à écrire dans le manuel: il sera ainsi adapté aux conditions locales. Les AVC devront conserver le manuel sur eux pendant leurs tournées. S'il est usé au point d'être illisible, tant mieux; il faudra alors le remplacer.**

**Les problèmes, le texte et les illustrations devront être adaptés aux conditions propres à chaque pays et à chaque communauté où travaillent les AVC. A la FAO et au Centre collaborateur de l'OMS et de la FAO pour la recherche et la formation en santé publique vétérinaire, nous espérons fermement que ce manuel sera bien**

**utilisé, adapté et traduit dans différentes langues et qu'il se révélera utile pour améliorer les conditions de vie des populations locales.**

**Nous adressons nos vifs remerciements à M. Talib M. Ali, vétérinaire et spécialiste de la formation, qui a préparé la documentation et rédigé le texte, et à Mme G. Morosetti, biologiste et illustratrice, qui a exécuté les nombreux dessins du manuel.**

---



---

## **Introduction**

**Le présent manuel est avant tout un guide pratique (première partie) pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies courantes des animaux utilisés pour l'alimentation humaine, pour une alimentation correcte de ces animaux et pour des pratiques zootechniques utiles en vue d'élever des animaux sains et productifs. Il contient aussi des recommandations (deuxième partie) adressées aux moniteurs et surveillants des agents vétérinaires communautaires. Enfin, la troisième partie propose des principes directeurs pour adapter le manuel aux conditions qui règnent dans différents pays.**

**Qui est l'agent vétérinaire communautaire (AVC)?**

**L'AVC est un homme ou une femme qui peut lire et écrire et qui est choisi(e) par la collectivité locale, ou avec son accord, pour s'occuper de la production et de la santé animales dans la communauté.**

### **Conditions de travail**

**L'AVC relèvera à la fois des autorités locales et du représentant local des services vétérinaires de l'Etat. Il se conformera aux instructions des autorités vétérinaires de l'administration locale et travaillera comme membre d'une équipe.**

**L'AVC sera rémunéré pour son travail, en nature ou en espèces, par la communauté locale; il travaillera à plein temps ou à temps partiel selon les besoins.**

### **Quelle formation l'AVC recevra-t-il?**

**L'AVC sera formé au départ par des fonctionnaires des services vétérinaires publics. Il s'agira d'une formation pratique dispensée à proximité de son domicile. Cette formation sera assurée de préférence par des fonctionnaires des services vétérinaires locaux qui devront dispenser en outre une formation continue ou périodique sur place. Il faudra élaborer un plan pour la poursuite de la formation.**

### **Quelles seront les tâches de l'AVC?**

**Les activités de l'AVC porteront à la fois sur les soins de santé pour les animaux et sur le développement communautaire, puisque la santé des animaux et celle de la communauté sont très fortement influencées par toute amélioration de l'environnement.**

**L'activité de l'AVC en matière de production et de santé animales se limitera à ce qu'il a appris. L'AVC doit avoir conscience de ses limites et savoir que le nombre des choses qu'il peut faire est restreint. Il ne sera pas capable de résoudre tous les problèmes qu'il rencontrera, mais il devra pouvoir faire face aux problèmes les plus courants et les plus urgents.**

**Le travail de développement communautaire de l'AVC doit servir à encourager les autorités locales et la population à faire preuve d'initiative et à s'intéresser à toute activité susceptible d'améliorer les conditions d'existence. L'AVC devra toujours déterminer ce qui peut être fait sur place avec les propres ressources de la communauté et aux moindres frais.**

**Les tâches de l'AVC dépendront des problèmes qui surgissent, lesquels varieront d'un pays et d'un lieu à l'autre. Il n'est pas possible de dresser une liste de problèmes valables dans le monde entier.**

**A partir des problèmes choisis qui constituent la première partie du manuel, on peut esquisser comme suit les fonctions de l'AVC:**

- 1. Soigner les animaux malades, protéger la santé de la population et veiller à l'hygiène dans la communauté.**
- 2. Fournir des informations fiables sur l'alimentation animale et les méthodes d'élevage, afin d'améliorer la productivité des animaux qui servent de nourriture à l'homme.**
- 3. Donner des conseils à quiconque le consulte, en se conformant aux instructions contenues dans le présent manuel ou émanant des services**

## **vétérinaires du pays.**

**4. Aiguiller les animaux malades sur le centre vétérinaire le plus proche ou contacter les autorités vétérinaires locales, afin qu'elles rendent visite à la communauté pour examiner et soigner les animaux malades. L'AVC doit donc limiter son traitement et ses conseils aux cas, aux états et aux situations décrits dans le manuel.**

**5. Rendre visite, avec l'autorisation des autorités locales, à tous les agriculteurs et expliquer aux gens comment éviter les maladies et accroître la productivité des animaux qui fournissent de la nourriture à l'homme.**

**6. Soumettre périodiquement aux autorités locales des rapports sur la santé et la productivité des animaux appartenant à la communauté. Obtenir des autorités locales et de la population l'appui nécessaire pour son travail.**

**7. Rester le plus possible en contact étroit avec les autorités vétérinaires locales, afin de pouvoir travailler au mieux de ses capacités et obtenir le matériel et les fournitures nécessaires.**

**8. Favoriser les activités de développement communautaire et y jouer un rôle actif.**

***Pour s'acquitter de ces fonctions, l'AVC:***

**a) est disponible à tout moment pour répondre aux appels d'urgence;**

**b) agit en toutes circonstances avec bon sens et dans le respect des tâches qui lui incombent, en ayant conscience de ses limites et de ses responsabilités;**

**c) ne quitte pas la communauté sans en avoir d'abord avisé les autorités locales;**

**d) participe aux activités de formation organisées par les services vétérinaires.**

**L'AVC doit passer quelque temps avec d'autres agents du développement social s'occupant de l'amélioration des pratiques agricoles, de la protection des produits alimentaires, de l'approvisionnement en eau, de l'économie familiale, etc. Il doit être au courant des services et des possibilités de développement qui existent dans le district et tenir la communauté bien informée.**

**Ainsi, L'AVC reflète dans la pratique la détermination d'une communauté à assumer elle-même la responsabilité de la production et de la santé de ses animaux et à combler toutes les lacunes qui pourraient se manifester dans la couverture des services vétérinaires. L'AVC doit améliorer la participation de la communauté à ce qui sera un programme de santé provincial/national préparé et appliqué par les autorités vétérinaires du pays avec la contribution active de la population.**





---

## Chapitre 1: Les animaux et la communauté

---

[Module 1: Pourquoi élevons-nous des animaux?](#)

[Module 2: Les animaux et l'environnement](#)

---

### Module 1: Pourquoi élevons-nous des animaux?

***Nous élevons des animaux pour qu'ils nous fournissent:***

- ***la viande***
- ***le lait***
- ***les œufs***
- ***la laine et le crin pour l'habillement, les cordages et les tentes***
- ***les peaux pour le cuir***
- ***les os, les sabots et les cornes pour divers usages.***

***Certains animaux sont utilisés pour le transport, le labourage et divers travaux.***

***Nous tirons toujours quelque profit des animaux que nous élevons.***

### Objectifs d'apprentissage

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**



- 1 Quels sont les animaux élevés dans votre communauté.**
- 2 Comment les animaux sont utilisés.**
- 3 Si les animaux dans votre communauté ou votre village sont sains et satisfaisants.**

**Quels sont les animaux élevés dans votre communauté?**

**Si vous souhaitez être un bon agent vétérinaire communautaire (AVC), il est très important que vous sachiez quels sont les animaux élevés par les membres de votre communauté. Il vous faut connaître parfaitement votre communauté et découvrir qui élève des animaux et quels types d'animaux. Vous devez travailler avec tout le bétail de la communauté.**

**A quoi servent les animaux?**

**Pour quel usage votre communauté élève-t-elle des animaux? Les animaux sont-ils élevés pour la viande ou pour le travail? Fournissent-ils du lait? Quelles autres choses obtenez-vous du bétail que vous élevez?**

**Si vous élevez des animaux pour la viande, abattez-vous les bêtes jeunes ou âgées? Votre communauté élève-t-elle certains animaux uniquement pour le travail ou pour la viande, pour fournir du lait ou pour d'autres raisons? Essayez d'en savoir le plus possible sur l'usage qui est fait des animaux dans votre communauté.**

**Dans quelle mesure vos animaux sont-ils satisfaisants?**

**Vos animaux vous donnent-ils assez de lait ou de viande? Votre bétail est-il**

**meilleur que celui des communautés ou régions voisines? Comment vos animaux diffèrent-ils de ceux des communautés voisines?**

**Les communautés des régions voisines peuvent élever des types d'animaux différents. Par exemple, les vaches dans une région peuvent produire plus de lait ou fournir une meilleure viande que celles d'une autre région. Vous devez examiner votre bétail et le comparer avec celui des communautés voisines. Entretenez-vous avec des membres d'autres communautés ou avec d'autres agents vétérinaires communautaires.**

**Peut-être connaissez-vous déjà certains des problèmes de santé du bétail de votre communauté. Si vous parlez avec d'autres membres de la communauté, vous découvrirez probablement d'autres problèmes de santé animale. Certains problèmes peuvent concerner telle race ou tel type d'animal et non tel autre. Voici quelques-uns des problèmes de santé que vous découvrirez peut-être:**

- **Des animaux meurent subitement.**
- **Des animaux sont nés malades ou morts.**
- **Les pattes et les pieds posent des problèmes.**
- **Les animaux souffrent d'affections cutanées.**
- **Les animaux ne prennent pas de poids.**
- **Le bétail est attaqué par des vers, des tiques ou des poux.**
- **Les pis des animaux laitiers sont tuméfiés et le lait contient du sang.**
- **Les poules ne pondent plus ou meurent subitement.**

**Il peut y avoir un très grand nombre de problèmes de santé. Vous devez vous entretenir avec les membres de votre communauté pour découvrir les divers**

**problèmes que leur pose la santé de leurs animaux, mais essayez aussi de savoir quels sont les problèmes dans les communautés voisines. Vous constaterez peut-être que vous avez les mêmes problèmes, ou bien vous pourrez acquérir des connaissances qui vous aideront à éviter qu'un problème de santé ne se pose également pour le bétail de votre communauté.**


**Vous devez maintenir de bons contacts avec le vétérinaire et le spécialiste de l'élevage les plus proches. N'oubliez pas qu'ils sont là pour vous aider.**

**Tenez à jour un registre vétérinaire pour votre communauté**

**Vous réussirez mieux votre travail d'agent vétérinaire communautaire si vous tenez un registre des problèmes de santé ou autres du bétail de votre communauté.**

**Tenez un registre des personnes qui élèvent les divers animaux. Découvrez et notez les problèmes qu'elles rencontrent. Parlez avec le propriétaire des animaux pour déterminer si les problèmes se posent à une époque de l'année ou à une période déterminée, ou s'ils sont en rapport avec la nourriture ou l'approvisionnement en eau, les déplacements du bétail ou l'introduction de nouveaux animaux dans le troupeau (voir annexe 5).**

**Tenez à jour un registre vétérinaire pour votre communauté**



## Module 2: Les animaux et l'environnement

***L'environnement, c'est ce qui vous entoure. Les plantes, l'eau, le sol et le climat font partie de votre environnement.***

***L'homme élève des animaux qui correspondent à ses besoins et à son environnement.***

***Le nombre d'animaux que nous pouvons élever dans une zone donnée est limité.***

***Si nous ne tenons pas compte de ces faits, nous risquons d'avoir des problèmes***

## ***de gestion et de santé avec notre bétail et d'endommager l'environnement local.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**


- 1 Quels problèmes peuvent surgir si on élève un trop grand nombre d'animaux.**
- 2 Si les animaux que vous élevez correspondent bien à votre environnement et à vos besoins.**
- 3 Quelles sont les différentes races (types) d'animaux élevés dans votre communauté.**
- 4 Quelles sont les terres de la communauté qui ont été endommagées par des animaux.**

### **Différentes races (types) d'animaux**

**Dans le monde entier, l'homme élève des animaux qui conviennent à l'environnement local. La nourriture, l'eau et le climat sont les principaux facteurs qui déterminent quels sont les animaux dans une région donnée. C'est pourquoi il existe une grande diversité de races animales dans le monde.**


- En Angleterre, les moutons ont une toison épaisse qui les protège du froid l'hiver. En Somalie, où le climat est très chaud, les ovins ont un pelage léger composé de poils.**

### **Différentes races (types) d'animaux**



- **Les vaches frisonnes produisent beaucoup de lait sur les riches herbages des pays à climat frais. En Inde, les bovins de la race Sahiwal sont de bons producteurs de lait dans un climat tropical chaud.**

**Différentes races (types) d'animaux**



- En Chine, les porcs sont nourris principalement d'aliments de lest et ont donc acquis un gros ventre pour assimiler ce type de nourriture. En Europe, les porcs mangent beaucoup de céréales et leur corps est moins gras.

### Différentes races (types) d'animaux

N'oubliez pas que le bétail dans votre communauté a évolué pendant une longue période. Ces animaux sont habitués à votre environnement.

Parfois, les gens veulent introduire de nouvelles races dans une région. Il faut examiner la question soigneusement et prendre l'avis des connaisseurs car il se peut que les nouvelles races ne conviennent pas à leur nouvel environnement.

**Nombre d'animaux élevés dans la communauté**

**Nous ne devons pas conserver les animaux qui sont âgés ou stériles car ils mangeront la nourriture qu'il serait préférable de donner à des animaux jeunes.**

**Vous devez examiner le nombre d'animaux élevés dans votre communauté. Disposent-ils d'assez de fourrage et d'eau pendant toute l'année? Discutez avec les anciens et les dirigeants de votre communauté de tout problème que vous avez pu découvrir au sujet du nombre d'animaux, ainsi que du fourrage et de l'eau disponibles. Le contrôle et la planification de l'effectif du bétail, de même que la possibilité de disposer de fourrage et d'eau dans des conditions satisfaisantes, sont des aspects essentiels pour les soins vétérinaires primaires.**

### **Problèmes de surcharge (trop d'animaux)**

**Si nous n'élevons pas un effectif de cheptel correspondant au fourrage et à l'eau disponibles:**

- **Les animaux perdent du poids et tombent malades, et la maladie se propage.**
- **Les animaux ne se reproduisent pas bien et les jeunes meurent.**
- **Il y a surpâturage et perte d'herbages, de buissons et d'arbres.**
- **La perte de végétation entraînera une érosion du sol et la disparition de bonnes terres.**

***Parlez aux anciens de votre communauté; découvrez quels changements ont eu lieu dans l'environnement et ce qui a pu les causer. Peut-on améliorer la situation?***

---





---

## Chapitre 2: L'organisme animal

---

[Module 3: Les organes et les systèmes de l'organisme](#)

[Module 4: La température du corps](#)

[Module 5: Apparence extérieure \(habitus\) de l'animal sain](#)

[Module 6: Propagation de la maladie](#)

---

### Module 3: Les organes et les systèmes de l'organisme

***L'organisme est composé de millions de cellules que vous ne pouvez pas distinguer sans microscope. Des cellules spéciales se rassemblent pour former un organe. Un organe est une structure complexe à l'intérieur de l'organisme. Il a une ou plusieurs fonctions particulières. Un système organique se compose de plusieurs organes qui travaillent ensemble pour accomplir une fonction déterminée.***

***L'organisme animal compte neuf systèmes:***

***Musculature et squelette***

***Appareil circulatoire***

***Appareil urinaire***  
***Système sensoriel***  
***Appareil digestif***  
***Appareil respiratoire***  
***Système nerveux***  
***Organes de reproduction***  
***Système lympho-réticulaire***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quels sont les divers organes de l'organisme.**
- 2 Quelle est la position des principaux organes dans l'organisme.**
- 3 Quelle est la structure des systèmes de l'organisme.**
- 4 Comment fonctionnent les systèmes.**

## **Les organes de l'organisme**

**Un organe est une structure complexe qui accomplit une ou plusieurs fonctions particulières, par exemple:**

- L'œil est l'organe de la vue.**
- Les reins éliminent de l'organisme l'eau et les substances toxiques sous forme d'urine.**
- Le foie accomplit de multiples fonctions et intervient dans plusieurs systèmes.**

***Divers organes sont groupés pour former un système organique qui accomplit une fonction particulière.***

<b>Système ou appareil</b>	<b>Organes</b>	<b>Fonction</b>
<b>Musculature et squelette</b>	<b>Muscles (viande) os</b>	<b>Soutenir le corps et assurer son mouvement</b>
<b>Appareil digestif</b>	<b>Estomac, foie, intestin, pancréas</b>	<b>Digérer et absorber la nourriture</b>
<b>Appareil circulatoire</b>	<b>Cœur, vaisseaux sanguins</b>	<b>Le sang achemine les substances dans tout l'organisme</b>
<b>Appareil respiratoire</b>	<b>Museau, trachée, poumon</b>	<b>Respiration</b>
<b>Appareil urinaire</b>	<b>Reins, vessie</b>	<b>Éliminer les toxines et les déchets (urine)</b>
<b>Système nerveux</b>	<b>Encéphale, nerfs, moelle épinière</b>	<b>Transmettre les messages dans l'organisme, commander l'organisme</b>
<b>Système sensoriel</b>	<b>Yeux, oreilles, chanfrein, peau</b>	<b>Sentir et détecter ce qui est extérieur à l'organisme</b>
<b>Organes de reproduction</b>	<b>Testicules, pénis, ovaires, utérus, vagin, vulve, pis</b>	<b>Produire et nourrir les jeunes animaux</b>
<b>Système lympho-réticulaire</b>	<b>Ganglions lymphatiques, rate</b>	<b>Protéger contre les maladies infectieuses, produire le sang</b>

## **La musculature et le squelette**

**Ce système se compose des os et des muscles (la viande). Les os forment le squelette qui est la structure à l'intérieur de l'organisme. Il porte le poids et soutient l'organisme.**

**Les os sont reliés entre eux afin de pouvoir bouger. Les endroits où cela se produit sont appelés articulations. Les os sont réunis aux articulations par des fibres élastiques appelées ligaments. Entre les os, se trouve une matière plus souple appelée cartilage qui amortit les os aux articulations quand le corps est en mouvement. Les os sont très durs et contiennent des minéraux. Chaque os porte un nom, par exemple l'omoplate ou le crâne. Il y a environ 200 os dans l'organisme.**

**Les muscles sont reliés aux os à leurs deux extrémités. Ils constituent la chair de l'organisme et quand ils se contractent (se raccourcissent) ou se détendent (s'allongent), ils font bouger les os.**

**Si vous pliez le bras, vous pouvez voir et sentir les muscles qui fonctionnent à l'intérieur.**

## **L'appareil digestif**

**L'appareil digestif se compose des dents, de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, du foie, de l'intestin, du pancréas et du rectum.**

**La digestion commence dans la bouche; la nourriture est brisée en petits morceaux par les dents et mélangée à la salive avant d'être avalée.**

**Dans l'estomac, la nourriture est mélangée aux sucs pour former une pâte molle. Celle-ci passe ensuite dans l'intestin où la bile provenant du foie et les sucs du pancréas s'y ajoutent. Ces sucs ont pour fonction de décomposer la nourriture et de permettre aux éléments nutritifs qu'elle contient d'être absorbés par le sang dans les parois de l'intestin. Les déchets s'accumulent dans le rectum et sont éliminés de l'organisme par l'anus (ou le cloaque chez les oiseaux).**

## **L'appareil digestif**

### **L'appareil circulatoire et le sang**

**Les organes de l'appareil circulatoire sont le cœur et les vaisseaux sanguins. Le cœur, qui se trouve dans la cavité thoracique, est une pompe musculaire qui achemine le sang dans tout l'organisme.**

**Les vaisseaux sanguins qui éloignent le sang du cœur sont appelés artères. Le sang retourne au cœur dans les veines. Les artères sont reliées aux veines par un fin réseau de petits tubes appelés capillaires. Les capillaires se trouvent dans toutes les parties de l'organisme.**

**Quand le cœur bat, ses muscles se contractent et envoient le sang à travers les artères. Quand le cœur se détend, le sang y pénètre à partir des veines.**


**Chaque fois que le cœur bat, il envoie une pulsation dans les artères. Vous pouvez la sentir en certains points de l'organisme. En prenant son pouls, on peut compter la fréquence cardiaque (voir module 5). Vous pouvez prendre votre pouls au poignet.**

## L'appareil respiratoire

La respiration comprend l'inspiration et l'expiration.

Les deux poumons se trouvent dans le thorax, qui est protégé par la cage osseuse des côtes. La trachée achemine l'air des naseaux aux poumons, qui sont spongieux à cause de leurs alvéoles. A mesure que l'animal respire, l'air pénètre dans les poumons et en sort. A l'intérieur des poumons, l'oxygène dont l'organisme a besoin passe dans le sang dans les parois des poumons; l'eau et le dioxyde de carbone quittent le sang pour passer dans l'air qui est ensuite expiré.

### L'appareil respiratoire



## L'appareil urinaire

**Les principaux organes sont les deux reins, qui s'appuient à la colonne vertébrale, et la vessie.**


**Les déchets et l'eau sont retirés du sang dans les reins et forment l'urine. L'urine s'accumule dans la vessie, puis elle est éliminée de l'organisme.**

**Le système nerveux et le système sensoriel**

**Les os du crâne et la colonne vertébrale protègent l'encéphale et la moelle épinière qui sont mous. Des fibres appelées nerfs passent de l'encéphale et de la moelle épinière à toutes les parties de l'organisme.**

**Les messages sont transmis des diverses parties de l'organisme le long des nerfs jusqu'à l'encéphale. L'encéphale renvoie un message indiquant aux différentes parties de l'organisme ce qu'elles doivent faire. L'encéphale commande l'organisme.**

**Le système nerveux et le système sensoriel**



**L'encéphale commande aussi les sens. Les organes des sens sont les suivants:**

- les yeux pour la vue
- les oreilles pour l'ouïe
- les naseaux pour l'odorat
- la langue pour le goût
- la peau pour le toucher


**Les organes de reproduction**

**Les organes masculins de reproduction, appelés testicules, se trouvent dans la bourse (le scrotum) derrière le pénis. Les testicules produisent les spermatozoïdes qui sont contenus dans le sperme liquide. Un tube sort de chaque testicule et les deux se rejoignent pour former un autre tube qui est au centre du pénis.**




## Chez l'oiseau, les testicules sont à l'intérieur du corps.

### Organes de reproduction et appareil urinaire du mâle



Les organes de reproduction de la femelle se composent de deux ovaires, un de chaque côté du bas de l'abdomen. Les ovaires produisent les œufs ou ovules qui passent dans l'utérus. Sous l'utérus se trouve le vagin qui débouche à l'extérieur, entouré de la vulve. Après la naissance, les petits sont nourris avec le lait produit par la mamelle.

## Organes de reproduction et appareil urinaire de la femelle



**Pendant l'accouplement (saillie ou monte), les spermatozoïdes passent du mâle dans l'utérus et rejoignent les ovules qui s'y trouvent. Quand le spermatozoïde rejoint l'ovule, il forme l'embryon qui se transforme en petit animal à l'intérieur de l'utérus.**

**La reproduction est commandée par des hormones (messagers chimiques) que le sang véhicule vers les différents organes. Ces hormones commandent:**

- **La puberté de l'animal**
- **La production des œufs**
- **La mise bas**
- **La production de sperme**
- **Le développement de l'embryon**
- **La production de lait**

## **Le système lympho-réticulaire**

**La lymphe est un liquide incolore qui passe du sang à un réseau de tubes très fins appelés réseau lymphatique. Elle traverse les ganglions lymphatiques, où les germes sont éliminés par filtration et tués, avant de retourner dans les veines. Par ailleurs, les ganglions lymphatiques et la rate produisent des cellules sanguines spéciales qui protègent l'organisme contre la maladie. Parfois, quand un animal est infecté, les ganglions lymphatiques sont tuméfiés et on peut les sentir sous la peau (voir module 75).**

## **Module 4: La température du corps**

***Le corps doit être maintenu à une température constante, avec très peu d'écarts, pour que tous les systèmes fonctionnent correctement. C'est la température normale de l'organisme.***

***Tout changement dans la température du corps est un signe de mauvaise santé.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir ce qu'on entend par:**

- 1 Température normale du corps.**
- 2 Forte température du corps.**
- 3 Basse température du corps.**
- 4 Prendre la température.**
- 5 Température normale du corps chez différents animaux.**

### **La température normale du corps**

**L'organisme ne peut fonctionner correctement qu'à une certaine température. Le corps de l'animal se maintient à une température constante, avec de très faibles écarts, afin que les systèmes fonctionnent correctement. Cette température normale du corps varie selon les différents types d'animaux.**

**Les animaux contrôlent la température de l'organisme de plusieurs façons:**

- Le poil, la laine, la marche, la course, les frissons et la combustion d'énergie dans le fourrage maintiennent la chaleur dans l'organisme.**
- La transpiration, le halètement, le bain de boue et le repos à l'ombre refroidissent l'organisme.**

### **Comment mesurer la température du corps**

**Nous utilisons un thermomètre pour mesurer la température du corps. L'unité de mesure est le degré centigrade (°C). La température normale de votre corps est 37 °C. Nous mesurons la température du corps des animaux en leur plaçant un**


## **thermomètre dans l'anus.**

### ***Le thermomètre***

- **Regardez votre thermomètre. Vous observez la colonne de mercure argentée à l'intérieur et l'échelle graduée avec des chiffres.**
- **Avant d'utiliser le thermomètre, vous devez vous assurer que le niveau du mercure est au-dessous de 35°C. Si ce n'est pas le cas, agitez le thermomètre pour faire baisser le niveau.**
- **Chaque fois que vous avez utilisé le thermomètre, lavez-le à l'eau froide et au savon ou désinfectez-le.**

***Ne lavez pas le thermomètre à l'eau chaude car il éclaterait. Ne le laissez pas au soleil car il pourrait éclater. Transportez le thermomètre dans un étui, dans votre poche ou dans un sac. N'utilisez pas votre thermomètre vétérinaire pour prendre la température des gens.***

### **Thermomètre**



## Comment prendre la température du corps des animaux

- Immobilisez l'animal.
- Déplacez la queue sur le côté.
- Enfoncez le thermomètre doucement le plus loin possible dans l'anus.
- Tenez le thermomètre de biais afin qu'il touche la paroi du rectum. Tenez fermement le thermomètre car si l'animal défèque ou tousse, le thermomètre pourrait être expulsé ou s'enfoncer dans le rectum.
- Maintenez le thermomètre en position pendant une demi-minute. Si vous n'avez pas de montre, comptez lentement jusqu'à 30 (un, deux, trois,... trente).
- Retirez le thermomètre, essuyez-le au besoin et lisez la température. Ne

**touchez pas le réservoir car cela pourrait modifier le résultat.**

### Comment prendre la température du corps des animaux



### Températures normales du corps

Animal	Température normale (°C)	Animal	Température normale (°C)
<b>Bovin</b>	38,5	<b>Veau</b>	39,5
<b>Buffle</b>	38,2	<b>Chèvre</b>	39,5
<b>Ovin</b>	39,0	<b>Chameau*</b>	34,5-41,0
<b>Lama, alpaga</b>	38,0	<b>Cheval</b>	38,0
<b>Ane</b>	38,2	<b>Porc</b>	39,0
<b>Poulet</b>	42,0	<b>Porcelet</b>	39,8

***La température du corps peut être supérieure ou inférieure de 1 °C à ces températures.***

***\* La température du corps du chameau varie selon l'heure et la possibilité de boire. Quand un chameau est abreuvé quotidiennement, la température de son corps passe de 36,5 °C le matin à 39,5 °C à midi; si l'animal ne reçoit pas d'eau, la température varie de 34,5 °C à 41 °C***

***Si vous soupçonnez un animal d'avoir une forte température, utilisez votre thermomètre pour vérifier. N'oubliez pas qu'une forte température est un indice de mauvaise santé. Quand un animal a une forte température, il a de la fièvre.***

## **Module 5: Apparence extérieure (habitus) de l'animal sain**

***Vous devez pouvoir distinguer entre un animal malade et un animal en bonne santé. Si vous êtes capable de reconnaître les signes de mauvaise santé chez le bétail, cela signifie que vous pourrez:***

- ***Assurer les premiers secours et soigner les animaux rapidement.***
- ***Empêcher la maladie de se propager à d'autres animaux***
- ***Déceler tous problèmes chez les animaux mis en vente.***
- ***Déceler tous signes de problèmes de santé chez les animaux destinés à la reproduction.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**



**1 Quelles sont les caractéristiques de l'animal en bonne santé.**

**2 Quels sont les signes de mauvaise santé.**

### **Apparence extérieure de l'animal (habitus)**

**L'animal en bonne santé est vif et conscient de son environnement. Il est actif et dresse la tête en regardant ce qui se passe autour de lui. Il doit se tenir sur toutes ses pattes. Si un animal se sépare des autres dans un groupe, c'est souvent le signe d'un problème de santé. Un animal qui ne s'intéresse pas à ce qui l'entoure et qui refuse de bouger a des problèmes de santé.**

### **Le mouvement (l'allure)**

**L'animal sain marche facilement et sans hésitations, en faisant porter son poids sur toutes ses pattes. Les pas doivent être réguliers. Un mouvement irrégulier est dû à des douleurs dans les pieds ou les membres. Normalement, les chevaux restent debout pendant la journée. Si vous approchez d'un animal couché, il doit vite se mettre debout; sinon, il a des problèmes de santé.**

### **Les yeux**

**Les yeux doivent être brillants et vifs, sans écoulement aux coins.**

### **Les oreilles**

**La plupart des animaux ont les oreilles dressées et qui se déplacent dans la direction d'un bruit. En outre, des mouvements rapides de l'oreille chassent les mouches. Enfin, on peut vérifier la température du porc en lui touchant l'oreille: on**


**peut alors sentir s'il a une température anormalement élevée.**

## **Les naseaux et le mufle ou museau**

**Les naseaux doivent être propres et sans écoulement. Chez les bovins et les buffles, le mufle doit être humide et non pas sec. Chez les ovins et les caprins, le museau doit être frais et sec. Les animaux en bonne santé se lèchent souvent le museau.**

### **Les naseaux et le mufle ou museau**

**Museau**




## **La bouche**

**Il ne doit pas y avoir de la salive tombant de la bouche. Si la mastication est lente ou incomplète, l'animal a un problème dentaire.**

## **Le pelage**

**Chez les animaux à pelage court, par exemple les caprins et les bovins, le poil ou pelage de l'animal en bonne santé sera lisse et brillant. Les bovins, les buffles et les veaux lèchent leur pelage, ce qui laisse des traces visibles. Les chevaux ne doivent pas transpirer au repos.**

## **Le pelage**



**Chez la volaille, les plumes doivent être lisses et brillantes; elles ne doivent pas être ébouriffées. Chez le porc, une queue recourbée est un signe de bonne santé, tandis qu'une peau qui s'écaille indique des problèmes de santé.**

### **Le comportement**

**Si un cheval, une vache ou un buffle regarde constamment son flanc ou se donne des coups de pied dans le ventre, l'animal a mal à l'estomac.**

## **La respiration**

**Au repos, la respiration doit être tranquille et régulière. N'oubliez pas que le mouvement et la chaleur augmenteront la fréquence respiratoire. Si l'animal se repose à l'ombre, les mouvements du poitrail dus à la respiration doivent être difficiles à remarquer.**

## **Le pouls**

**Il est important de prendre le pouls (voir module 3) quand on examine un animal. Chez l'homme, il est facile de prendre le pouls; c'est plus difficile chez les animaux et il faut s'y exercer.**

- **Chez les ovins et les caprins, vous pouvez sentir battre le pouls à l'intérieur du haut de la cuisse arrière; chez l'animal adulte, il bat à 70-130 coups à la minute.**
- **On prend le pouls des bovins en un point situé au-dessous de la naissance de la queue; il bat normalement à 40-80 coups à la minute chez le bovin adulte. Chez le buffle, il bat à 40-60 coups à la minute.**
- **On prend le pouls du cheval dans le creux de la joue; la cadence normale est de 35-40 coups à la minute.**
- **On prend le pouls du chameau en un point situé au-dessous de la naissance de la queue; il bat normalement à 35-45 coups à la minute.**

**N'oubliez pas que le pouls bat plus vite chez le jeune animal. Pour prendre le**

**pouls, il faut le rechercher avec l'index et le médius.**

**Chez le lama, l'alpaga et le porc, il n'existe aucun point où l'on puisse prendre le pouls. Chez ces animaux, il faut essayer de sentir les battements du cœur lui-même.**

**Le crottin, la bouse ou la fiente**

**Les matières fécales de l'animal en bonne santé sont fermes. Quand elles sont très molles (diarrhée), c'est un signe de mauvaise santé. Si l'animal a du mal à déféquer (constipation), c'est aussi un signe de mauvaise santé.**

**L'urine**

**L'urine doit être limpide et l'animal ne doit manifester aucun signe de douleur ou de difficulté en urinant. Chez les chevaux, les mulets et les ânes, l'urine est normalement épaisse et jaune.**

**L'appétit et la rumination**

**L'animal doit manger et boire normalement. Le refus de s'alimenter est un signe manifeste de mauvaise santé. S'il dispose de fourrage, l'animal en bonne santé aura le ventre plein. Les porcs se précipitent tout naturellement sur leur nourriture; sinon, ils sont malades. Les ovins, les caprins, les bovins, les buffles et les chameaux ruminent pendant 6 à 8 heures par jour. C'est un signe de mauvaise santé quand ces animaux cessent de ruminer.**

**Le lait**

**Chez l'animal en lactation, toute modification soudaine de la quantité de lait produite peut indiquer un problème de santé. La présence de sang ou d'autres matières dans le lait est le signe d'une infection du pis. Le pis ne doit pas être tuméfié et il ne doit y avoir aucun signe de douleur quand on le touche. Les tétines ne doivent comporter aucune lésion.**

## **La température du corps**

**Si vous soupçonnez un animal d'être malade, vous devez prendre sa température (voir module 4). Quand la température relevée dépasse la température normale du corps, c'est le signe d'une infection.**

### **Un bon AVC apprend:**

- **A observer soigneusement l'animal normal à tout moment pour voir comment il se comporte.**

**Vous pourrez ainsi reconnaître les signes que quelque chose ne va pas.**

- **A interroger la personne qui garde les animaux pour découvrir si elle a remarqué chez eux quelque chose d'anormal.**

**N'oubliez pas que vous devez d'abord observer les animaux à distance, parler à la personne qui les surveille, puis les vérifier. Vous pourrez ensuite décider quoi faire.**

## **Module 6: Propagation de la maladie**

***La maladie survient quand il se produit quelque chose d'anormal dans l'organisme ou dans une partie de l'organisme.***

***Les maladies peuvent être provoquées par des germes, une nourriture défectueuse, des produits chimiques ou des traumatismes.***

***Les maladies causées par des germes sont appelées maladies infectieuses.***

***Une maladie infectieuse peut se transmettre d'un animal à l'autre.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Comment les animaux tombent malades.**
- 2 Ce qu'on entend par propagation d'une maladie.**
- 3 Ce qu'est une maladie infectieuse.**
- 4 Ce qu'est une maladie non infectieuse.**
- 5 Comment empêcher la propagation de la maladie.**

## **Les principales causes de maladie**

**La maladie peut être classée comme étant aiguë ou chronique. Une maladie aiguë débute rapidement et dure peu de temps, après quoi l'animal guérit ou meurt. Une maladie chronique dure longtemps et affaiblit l'animal. Les maladies sont dites infectieuses (elles se transmettent d'un animal à l'autre) ou non infectieuses (elles ne se transmettent pas d'un animal à l'autre).**



**Les maladies non infectieuses peuvent être provoquées par un fourrage défectueux et par l'absence des minéraux, des sels et des vitamines dont l'organisme a besoin. Les maladies non infectieuses peuvent aussi être causées par une intoxication due à des produits chimiques ou à des plantes, par des coupures, des brûlures ou des fractures des os. Certaines maladies sont transmises du parent au petit (maladies héréditaires).**

**Beaucoup de maladies non infectieuses sont chroniques, mais elles peuvent aussi être aiguës. Elles peuvent entraîner des pertes importantes de viande, de lait et de laine. Les bêtes de trait ne travaillent pas bien et le taux de reproduction peut être faible car les petits naissent morts ou meurent avant le sevrage. Les maladies chroniques sont souvent jugées «normales», mais quand la cause est connue et supprimée la production peut être grandement accrue.**

**Les maladies infectieuses apparaissent quand l'organisme est attaqué par de minuscules germes vivants.**

**La propagation de la maladie**

**Les maladies infectieuses peuvent être propagées par:**

- **Contact direct entre animaux.**
- **Des germes dans la nourriture et l'eau.**
- **Les matières fécales et l'urine provenant d'animaux malades.**
- **Les mouches, les tiques, les poux et les puces.**
- **La saleté dans les étables ou les abris.**

## **Les animaux jeunes ou âgés sont infectés plus facilement.**

### **La prévention des maladies infectieuses**

- **Tout comme les humains, les animaux doivent être propres pour garder la santé. L'animal doit disposer de nourriture, d'eau, d'une litière et d'un abri propres.**
- **Les animaux malades doivent être séparés des autres.**
- **Certaines maladies peuvent être guéries par des médicaments.**
- **La vaccination peut protéger les animaux contre certaines maladies.**
- **Il faut éliminer les animaux morts et les déchets.**

#### ***N'oubliez pas ceci:***

- ***Une conduite satisfaisante de l'élevage peut éviter la propagation de la maladie. Le fait de laisser des animaux ensemble accroît risque de propagation de la maladie par contact. Les nouveaux bestiaux doivent être maintenus séparés des autres pendant deux semaines afin qu'on puisse vérifier chez eux tout signe de maladie.***
- ***Il faut éviter de mélanger les troupeaux. Essayez de maintenir les troupeaux séparés sur les lieux où ils s'abreuvent et se nourrissent.***
- ***Vous devez séparer et isoler tout animal qui manifeste des signes de maladie.***

## La prévention des maladies non infectieuses

La maladie non infectieuse chronique peut ne pas être reconnue comme étant une maladie. Il se peut que les animaux atteints ne meurent pas, mais qu'ils ne puissent pas produire autant de lait, de viande ou de laine que prévu, ni travailler aussi bien.

Si nous recherchons continuellement les moyens d'améliorer l'affouragement, l'eau et l'apport de minéraux et de vitamines, nous parviendrons à maîtriser les maladies non infectieuses. Cela permettra de produire davantage de laine, de viande et de lait. Les animaux de trait seront plus vigoureux et le nombre des petits augmentera. Les volailles produiront plus d'œufs et engraisseront mieux.



---

## Chapitre 3: Bovins, ovins, caprins et buffles

---

[Module 7: Les ruminants](#)

[Module 8: La météorisation](#)

[Module 9: Comment déterminer l'âge des ovins, des caprins, des bovins et des buffles](#)

[Module 10: Contention des bovins et des buffles](#)

[Module 11: Le soin des pieds \(sabots ou onglons\)](#)

[Module 12: La tonte](#)

[Module 13: Décornage des veaux, des agneaux et des cabris](#)

[Module 14: La castration des ruminants](#)

[Module 15: Les parasites internes \(endoparasites\) des ruminants](#)

[Module 16: Les parasites externes \(ectoparasites\) des ruminants](#)

[Module 17: Les signes de rut \(chaleurs ou œstrus\) chez les ruminants](#)

[Module 18: La gestation chez les ruminants](#)

[Module 19: Vêlage \(parturition\)](#)

[Module 20: Mise bas des agneaux et des cabris](#)

[Module 21: Soins au nouveau-né](#)

[Module 22: La production de lait et la mamelle](#)

[Module 23: L'affouragement et l'abreuvement des ruminants](#)

[Module 24: Aménagement des pâturages](#)

[Module 25: La peste bovine et la fièvre aphteuse](#)

---

**Module 7: Les ruminants**

[Carnivore, omnivore et herbivores](#)

**Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quels sont les différents groupes d'animaux.**
- 2 Ce qu'est le rumen (la panse).**
- 3 Ce qui rend les ruminants différents.**

## **4 Pourquoi les animaux ruminent.**

### **Ce que mange chaque animal**

#### **Les animaux se répartissent en trois groupes:**

- **Les carnivores qui mangent de la viande, par exemple le chien ou le lion.**
- **Les omnivores qui mangent de la viande et des plantes, par exemple le porc.**
- **Les herbivores qui mangent des plantes, par exemple la vache ou le cheval.**

**L'appareil digestif des omnivores et des carnivores est analogue à celui qui est décrit dans le module 3. Les herbivores ont un appareil digestif de très grande taille parce qu'ils mangent beaucoup d'herbe.**

- **Le cheval, l'âne et le mulet sont des herbivores, mais ils ne ruminent pas; ce ne sont pas des ruminants.**
- **Les bovins, les caprins, les ovins et les buffles ruminent; ce sont des ruminants.**

#### **La panse ou rumen (estomac)**

**L'estomac d'un ruminant comporte quatre compartiments. Le premier est très grand et s'appelle le rumen ou la panse; le deuxième est le bonnet; le troisième est le feuillet; le quatrième est la caillette, appelée aussi quatrième estomac. Le ruminant mastique l'herbe et l'avale: elle va dans le rumen.**

## **La panse ou rumen (estomac)**


**Quand le ruminant a fini de manger, il régurgite sa nourriture et la remastique. C'est ce qu'on appelle la rumination. Si l'animal cesse de ruminer, c'est un signe de mauvaise santé.**

**Les ruminants produisent beaucoup de gaz dans leur estomac et ils ont une éructation par minute (contrairement à l'homme, l'éructation se fait sans bruit). Si l'animal cesse d'éructer, son estomac est tuméfié par les gaz; c'est ce que nous appelons la météorisation (module 8).**

### **Le mouvement du rumen**

**Le rumen a des mouvements réguliers et se contracte une fois par minute. En plaçant le poing sur le flanc gauche (dans le creux derrière les côtes), vous pourrez déceler les contractions. Des contractions régulières sont un signe de bonne santé.**

### **Le mouvement du rumen**



### **Présence de clous et de fil de fer dans le rumen**

**Du fait que les ruminants mangent rapidement, ils risquent d'avaler dans leur fourrage des objets comme les clous ou le fil de fer. Ces objets peuvent endommager le rumen; ils peuvent traverser la paroi du rumen, pénétrer dans le cœur et tuer l'animal.**

***Vous devez dire à votre communauté d'éviter de laisser des clous, du fil de fer ou des objets analogues dans le fourrage des animaux ou dans les pâturages.***

## **Module 8: La météorisation**

***La météorisation a lieu quand trop de gaz sont produits dans le rumen.***

***Le flanc gauche est gonflé et la respiration devient difficile.***

***Cela peut survenir soudainement, surtout quand l'animal broute de l'herbe mouillée le matin.***

***La météorisation peut entraîner la mort subite.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Ce qu'est la météorisation.**
- 2 Ce qui cause la météorisation chez le ruminant.**
- 3 Comment éviter la météorisation.**
- 4 Comment soigner l'animal atteint de météorisation.**

### **Qu'est-ce que la météorisation?**


**Dans le module 7, vous avez appris que l'estomac des ruminants produit beaucoup de gaz. Les animaux éructent continuellement, une fois par minute, pour se débarrasser des gaz. Occasionnellement, l'éruclation cesse et les gaz**



**s'accumulent dans le rumen, provoquant la météorisation.**

**A mesure que les gaz s'accumulent, le flanc gauche devient ballonné. La douleur qui en résulte incite l'animal à essayer de se donner des coups de pied dans le ventre, ou bien il se tient debout avec les membres postérieurs très écartés. Il éprouve de la difficulté à respirer.**

**Qu'est-ce que la météorisation?**



**L'animal peut souffrir pendant plusieurs heures, mais dans les cas graves de météorisation on le trouvera couché sur le flanc et la mort pourra survenir au bout de quelques heures.**

**Les causes de météorisation**

**La météorisation peut se produire quand l'animal broute de jeunes herbages riches, surtout s'ils sont mouillés. Certains végétaux tels que le trèfle ou la luzerne risquent tout particulièrement de causer la météorisation, mais celle-ci peut être provoquée par toute plante à croissance rapide.**

**Parfois, les ruminants élevés au foyer et nourris uniquement d'aliments tels que le pain sec peuvent être atteints de météorisation.**

### **Comment empêcher la météorisation**

- **Evitez de conduire les animaux sur des herbages mouillés, surtout tôt le matin.**
- **Ne laissez pas des animaux qui ont très faim brouter une prairie. Avant de les mettre au pâturage, offrez-leur d'abord du foin sec.**
- **Surveillez les animaux au pâturage.**

### **Traitement**

**L'une des façons de traiter la météorisation est de provoquer l'éructation chez l'animal. Vous devez procéder ainsi:**



- **Massez le rumen tuméfié à travers la paroi abdominale.**
- **Fixez un bâton au travers de la bouche, comme le mors d'un cheval.**
- **Chatouillez la gorge.**
- **Faites marcher l'animal pendant une demi-heure environ.**

**Si ces méthodes ne donnent aucun résultat, administrez un breuvage (liquide) à l'animal (voir «Administration d'un breuvage», annexe 3). On peut utiliser l'un des breuvages suivants:**

- **Deux grandes cuillerées de détergent liquide, par exemple Fairy ou Lux.**
- **Une solution de bicarbonate de sodium et d'eau.**
- **Une petite quantité de paraffine dans du lait chaud.**
- **Une petite bouteille d'huile d'arachide, de soja ou de graine de lin.**
- **Une très petite quantité de térébenthine dans de l'huile de graine de lin, de l'huile de soja ou de l'huile d'arachide.**
- **Un médicament disponible dans le commerce (voir R20, annexe 1).**

**Dans les cas graves, il se peut que l'animal n'éructe pas; il risque alors de mourir. En pareil cas, il est nécessaire de percer le flanc gauche avec un couteau pointu ou un trocart muni d'une canule pour libérer les gaz. Vous devrez agir vite car toute hésitation peut entraîner la mort de l'animal.**

## **Traitement**



***La météorisation est parfois due au fait que de gros morceaux de fourrage bloquent l'œsophage. Dans ce cas, essayez de masser l'encolure pour supprimer ce blocage.***

## **Module 9: Comment déterminer l'âge des ovins, des caprins, des bovins et des buffles**

***On peut déterminer l'âge des animaux en examinant les dents de devant.***

***Vous ne pourrez pas déterminer l'âge exact, surtout chez les animaux plus âgés.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**


#### **1 Comment tenir les animaux pour vérifier les dents.**

**2 Quelle est la différence entre les dents provisoires (dents de lait) et les dents permanentes.**

**3 Comment déterminer l'âge des ovins, des caprins, des bovins et des buffles.**

**Comment immobiliser les animaux pour vérifier leurs dents**

**Comment immobiliser les animaux pour vérifier leurs dents**



**Dents provisoires (dents de lait) et dents permanentes**

**Comme les enfants, les jeunes animaux ont une denture provisoire (dents de lait) qui sera remplacée par une denture permanente.**

**Les jeunes ruminants ont 20 dents provisoires, les ruminants adultes ont 32 dents permanentes.**

**Dents provisoires (dents de lait):**

**Mâchoire du haut: pas d'incisive 6 molaires**

**Mâchoire du bas: 8 incisives 6 molaires**

**Dents permanentes:**

**Mâchoire du haut: pas d'incisive 12 molaires**

**Mâchoire du bas: 8 incisives 12 molaires**


***N'oubliez pas que vous ne pourrez pas déterminer l'âge exact de l'animal d'après sa denture; il y aura un écart de quelques mois en plus ou en moins.***

***Vous devrez prendre l'habitude de vérifier périodiquement les dents des animaux (pas seulement pour déterminer l'âge), mais aussi parce que des dents en mauvais état ou usées empêchent un animal de manger ou de ruminer. Un tel animal ne sert plus à rien.***


**L'âge des caprins et des ovins**

- (1) Animal de moins de 1 an (pas de dents permanentes)**
- (2) Agé de 1 an (2 dents permanentes)**
- (3) Agé de 2 ans (4 dents permanentes)**
- (4) Agé de 3 ans (6 dents permanentes)**
- (5) Agé de 4 ans (8 dents permanentes)**
- (6) Animal âgé de plus de 4 ans**

# L'âge des caprins et des ovins



1



2




3



4



5








6



## **L'âge des bovins**

- (1) Moins de 2 ans (pas de dents permanentes)**
- (2) Agé de 2 ans et 3 mois (2 dents permanentes)**
- (3) Agé de 3 ans (4 dents permanentes)**
- (4) Agé de 3 ans et 6 mois (6 dents permanentes)**
- (5) Agé de 4 ans (8 dents permanentes)**
- (6) Animal âgé de plus de 4 ans**


## **L'âge des bovins**




## L'âge des buffles

- (1) Moins de 3 ans (pas de dents permanentes)**
- (2) Agé de 2 ans et 6 mois (2 dents permanentes)**
- (3) Agé de 3 ans et 6 mois (4 dents permanentes)**
- (4) Agé de 4 ans et 6 mois (6 dents permanentes)**
- (5) Agé de 5 à 6 ans (8 dents permanentes)**
- (6) Animal âgé**

## **L'âge des buffles**



1



2




3



4



5



6

## **Module 10: Contention des bovins et des buffles**

***La manipulation des bovins et des buffles peut produire le stress et des traumatismes, surtout si les animaux n'ont pas l'habitude d'être manipulés et si la personne n'est pas expérimentée.***

***Il existe différentes techniques pour la contention des grands ruminants et pour les faire coucher (en les faisant tomber).***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Comment tenir les bovins et les buffles.**
- 2 Comment utiliser un licol en toute sécurité.**
- 3 Comment coucher (faire tomber) les animaux avec des cordes.**

### **Contention des grands ruminants**


**Le couloir ou dispositif de contention est en bois ou en métal. Vous devez en avoir un dans votre village; sinon, vous devrez envisager avec les anciens de la communauté d'en fabriquer un avec l'aide d'un vétérinaire. Les couloirs ou dispositifs de contention sont utilisés pour les grands ruminants quand ils sont vaccinés ou examinés ou quand ils subissent d'autres traitements.**

### **Comment tenir les animaux**

**Si vous n'avez ni licol ni pince mouchette, la meilleure façon de tenir un grand**

**ruminant consiste à saisir fermement les narines avec le pouce et l'index d'une main, tout en tenant la corne ou l'oreille de l'autre main.**

### Comment tenir les animaux




Pince mouchette

### Utilisation du licol sur les grands ruminants (bovins et buffles)

**Il faut habituer les animaux au licol, et il est préférable de le faire quand ils sont encore jeunes. Quand vous utilisez un licol sur un animal, parlez-lui pour l'encourager à bouger. Tenez le licol à pas plus de 20 cm de la joue de l'animal et marchez à côté de son encolure.**

### Utilisation du licol sur les grands ruminants (bovins et buffles)



## **Comment coucher ou faire tomber les bovins et les buffles**

**Si vous ne disposez pas d'un couloir de contention et si vous désirez rogner les sabots ou les onglons d'un animal, il vous faudra le coucher, c'est-à-dire le faire tomber.**


**Pour faire cela, il vous faudra:**

- **Un licol pour la tête.**
- **Deux personnes pour vous aider.**
- **De 10 à 12 m de corde solide.**
- **Un endroit où l'on peut faire tomber l'animal en toute sécurité, avec un sol mou ou recouvert de paille.**

**Placez d'abord le licol sur l'animal, puis fixez autour de lui la longue corde comme**

**indiqué sur l'illustration ci-dessous. Demandez à une personne de tenir le licol, tandis que l'autre se joint à vous pour tirer sur la corde. L'animal tombera sur le sol, et votre aide doit immédiatement placer son genou sur l'encolure de l'animal et sa main sur la tête pour l'empêcher de se relever.**

### **Comment coucher ou faire tomber les bovins et les buffles**



***Ne laissez pas l'animal couché trop longtemps car cela pourrait provoquer de la météorisation.***



***N'oubliez pas que lorsqu'on fait tomber des animaux, ces derniers aussi bien que les gens peuvent être blessés; tâchez donc de le faire en toute sécurité.***

## **Module 11: Le soin des pieds (sabots ou onglons)**

***Un vieux dicton affirme: «Pas de pied, pas d'animal». C'est exact, car si les pieds ne sont pas soignés, l'animal aura de mauvaises pattes; il ne pourra pas paître correctement et son état sera médiocre.***

***Il faut examiner et rogner périodiquement les pieds.***

***Quand vous coupez, ne dirigez pas l'instrument vers vous ou vers la main qui tient le pied de l'animal.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Pourquoi les pieds non rognés sont mauvais.**
- 2 Comment tenir ou faire tomber les animaux afin de leur rogner les pieds.**
- 3 Jusqu'à quel point on peut rogner le pied (le sabot ou l'onglon).**

### **Croissance excessive des pieds**


**L'onglon est comme vos ongles: il pousse continuellement. La marche l'use, mais parfois il pousse très vite et devient trop grand. Dans certains endroits où le terrain est détrempé, le pied peut s'infecter; il dégage une mauvaise odeur et il est douloureux. Cet état s'appelle le piétin et il peut entraîner la boiterie.**

**Quand les animaux ont les pieds infectés ou non rognés, ils ne peuvent pas se déplacer et paître correctement. Le mâle ne peut pas monter sur la femelle et il ne sert à rien.**

**Comment tenir ou faire tomber les animaux pour leur rogner les pieds**


**Vous pouvez rogner les pieds des ovins et des caprins seul ou avec quelqu'un pour vous aider. Saisissez la laine ou le poil sur la poitrine d'une main, tout en maintenant l'animal couché sur le flanc avec l'autre main. Avec le genou, poussez sur le dos de l'animal pour le forcer à s'asseoir. L'animal peut être maintenu longtemps dans cette position pendant qu'on lui rogne les pieds.**

**Comment tenir ou faire tomber les animaux pour leur rogner les pieds**



**Pour rogner les pieds des bovins ou des buffles, vous devrez coucher l'animal (voir module 10). La patte peut être soulevée et immobilisée, comme indiqué sur l'illustration.**

**Comment tenir ou faire tomber les animaux pour leur rogner les pieds**




### **Le rognage des pieds**

**Il vous faudra un outil bien aiguisé: couteau, rogne-pied, coupe-onglons, grosse râpe ou tenailles coupantes de menuisier.**

**Taillez l'excès de corne en la rognant soigneusement petit à petit. Arrêtez en cas de saignement. Ne rognez pas trop profondément. Comme votre ongle, l'étui corné du sabot ou de l'onglon comporte une zone sensible qui, si elle est entaillée, deviendra douloureuse et s'infectera. Arrêtez si la sole rebondit quand vous appuyez dessus avec le pouce. Quand vous aurez rogné la corne de l'onglon,**

**utilisez une râpe, si vous en avez une, pour limer et égaliser le bord.**

### **Le rognage des pieds**



**Si le pied est infecté et mouillé et dégage une mauvaise odeur, vous devez soigneusement enlever les parties endommagées afin que la zone infectée soit exposée à l'air. Vous devrez alors l'enduire de teinture d'iode ou de formol (voir R4, annexe 1). Renouvelez le traitement tous les deux jours.**

***N'oubliez pas d'utiliser les outils dont vous disposez et de vous occuper des pieds des animaux. Si vous vérifiez périodiquement les pieds et si vous les maintenez bien rognés, vous n'aurez pas de problème. Si vous élevez des ovins et s'il y a beaucoup de piétin dans votre région, demandez conseil à votre service vétérinaire et procurez-vous un vaccin contre le piétin.***

## **Module 12: La tonte**

***Les ovins perdent naturellement leur toison à l'époque la plus chaude de l'année; avant que cela ne se produise, nous devons donc les tondre afin de pouvoir utiliser la laine à diverses fins.***

***Si la laine est souillée par des crottes et mouillée, elle attire les mouches qui y déposent leurs œufs. Ceux-ci produisent des larves (asticots ou vers blancs) qui se nourrissent de la chair des ovins.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Pourquoi nous tondons les ovins.**
- 2 Comment retirer la laine souillée.**
- 3 Ce qui se passe si nous ne le faisons pas.**

### **Pourquoi tondons-nous les ovins?**

**Les moutons à laine doivent être tondus à certaines époques de l'année. Si nous ne procédons pas à la tonte, la laine ou le poil tombent en plaques; on perd ainsi**


**une matière précieuse.**

## **Enlèvement de la laine souillée**

**Il faut enlever la laine souillée et mouillée qui entoure la queue et l'anus du mouton. Cette laine mouillée et souillée attire les mouches, en particulier les lucilies (appelées communément «mouches vertes» ou «mouches dorées»). Les mouches pondent leurs œufs sur la laine, et les larves éclosent un ou deux jours plus tard. Ces larves creusent des galeries dans la peau et se nourrissent de la chair du mouton. Celui-ci dégagera une mauvaise odeur et il sera nerveux, tapant des pieds et agitant la queue.**

**Il faut retirer les larves d'un mouton infecté. Ecartez la laine et recherchez les petites perforations de la peau par lesquelles les larves ont pénétré. Appuyez tout autour des perforations avec les doigts, et les larves en sortiront. Elles seront nombreuses et de tailles différentes. Nettoyez les lésions (module 73) à la teinture d'iode ou au violet de gentiane (voir R1, annexe 1).**

## **Enlèvement de la laine souillée**



## La tonte

**On entend par tonte l'enlèvement total de la laine à la tondeuse à main ou à moteur. La laine précieuse est ensuite utilisée pour l'habillement, les tapis, etc. Veillez à ce que la laine reste propre en évitant de trop marquer les animaux à la peinture; si vous avez l'habitude de laver vos animaux avant la tonte, veillez bien à le faire trois ou quatre jours auparavant. Après la tonte, placez les sacs de laine dans un endroit sec sur des feuilles de plastique pour qu'ils ne deviennent pas humides.**

**Si l'animal subit des coupures pendant la tonte, traitez toutes les lésions immédiatement à la teinture d'iode ou au violet de gentiane (voir R1, annexe 1).**

***Si vous avez les moyens de faire passer vos ovins dans un bain de déparasitage, faites-le immédiatement après la tonte.***

## **Module 13: Décornage des veaux, des agneaux et des cabris**

***Les animaux qui ont été décornés sont dociles; ils ne se battent pas avec les autres et ne les blessent pas.***

***Il est préférable de procéder au décornage (ablation du bourgeon) quand l'animal est âgé de moins d'une semaine.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Pourquoi nous décornons les animaux.**
- 2 Quels outils il faut avoir pour enlever le bourgeon.**
- 3 Comment décorner les animaux.**

**Pourquoi enlevons-nous les cornes?**

**Si on enlève les cornes de l'animal:**

- Il risque moins de blesser d'autres animaux.**
- Il risque moins de blesser les gens.**
- Il a besoin de moins d'espace à la mangeoire.**


**Il est préférable d'enlever les cornes quand elles sont encore à l'Etat de bourgeons, c'est-à-dire quand l'animal est âgé de moins d'une semaine.**

**Outils utilisés pour enlever les bourgeons**



**Pour d'écorner un animal, vous avez besoin d'un fer qui peut être chauffé à l'électricité ou directement sur une flamme. L'extrémité du fer est ronde et creuse; elle se fixe sur le bourgeon de la corne (cornillon). *Il est préférable de décorner au fer chaud plutôt qu'à la soude caustique.***

### Outils utilisés pour enlever les bourgeons



**Il se peut que vous ayez un fer; sinon, demandez au forgeron de vous en fabriquer un.**

**Pour essayer le fer, chauffez-le bien, puis appuyez l'extrémité sur un morceau de bois. Un cercle bien rond doit être brûlé sur le bois. Vous devrez essayer le fer chaque fois que vous l'utiliserez pour être certain qu'il est assez chaud.**

### Décornage

**Il vous faudra quelqu'un pour vous aider. Ne vous brûlez pas avec le fer chaud.**

- **Maintenez bien l'animal. Votre assistant doit lui tenir la tête et tirer en**

**bas et vers l'extérieur l'oreille la plus proche du bourgeon (cornillon) que vous allez enlever. Il doit bien immobiliser la tête.**

- **Coupez les poils autour du cornillon.**
- **Essayez le fer chaud et, quand il est prêt, placez-le sur la racine du cornillon et tournez-le pendant une dizaine de secondes. Continuez jusqu'à ce que vous sentiez que le cornillon est délogé et chauffez de nouveau le fer si c'est nécessaire.**
- **Faites sortir le bourgeon ou cornillon en appuyant avec le fer.**

## **Module 14: La castration des ruminants**

***On entend par castration la destruction ou l'ablation des testicules du mâle. Elle est pratiquée sur les animaux qui ne sont pas destinés à la reproduction.***

***Les animaux ayant subi la castration sont dociles (ils ne se battent pas).***

***Certains pays insistent pour que tous les animaux importés aient subi la castration.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Pourquoi nous châtrons les animaux.**
- 2 Quand il faut châtrer les animaux.**

- 3 Comment maîtriser les animaux en vue de la castration.**
- 4 Comment pratiquer la castration avec un couteau.**
- 5 Comment pratiquer la castration avec une pince de Burdizzo.**
- 6 Comment pratiquer la castration avec des anneaux constricteurs en caoutchouc.**

## **Pourquoi pratiquons-nous la castration sur les animaux?**

**Traditionnellement, les agriculteurs ou les éleveurs ne pratiquent pas la castration sur leurs animaux, et les mâles et les femelles sont laissés ensemble. Le résultat est qu'on laisse des mâles médiocres (voir annexe 4) s'accoupler avec les femelles, et les petits ainsi produits ne sont pas satisfaisants. D'autre part, les mâles non châtrés se battent, de sorte qu'il est préférable de châtrer les animaux qui ne sont pas les meilleurs pour la reproduction.**

## **Quand pratiquons-nous la castration sur les animaux?**

**La meilleure époque pour châtrer les animaux est quand ils sont très jeunes (âgés de quelques jours seulement). Si la castration est pratiquée à ce moment-là, l'opération est plus simple, elle réussit mieux et la blessure se cicatrise très vite.**

## **La contention et la maîtrise des animaux en vue de la castration**

**Il vous faudra quelqu'un pour vous aider. Il est préférable de placer les jeunes agneaux et les cabris sur une table recouverte de sacs. Les veaux peuvent être châtrés en position debout, mais l'animal doit être maintenu très fermement.**

## **La contention et la maîtrise des animaux en vue de la castration**



## La castration avec un couteau (avec saignement)

Utilisez un couteau très bien aiguisé, un rasoir ou un scalpel.

- Vérifiez que le couteau, le rasoir ou le scalpel est bien aiguisé et très propre. Nettoyez la lame avec un désinfectant tel que l'alcool, la teinture d'iode ou le violet de gentiane.
- Utilisez de l'eau chaude et du savon pour essuyer le scrotum et pour vous laver les mains.
- Découpez une ouverture à la partie inférieure du scrotum. Pincez le testicule au-dessus de l'ouverture pratiquée dans le scrotum et il sera mis à nu.
- Tirez chaque testicule dehors, le plus loin possible, et tordez plusieurs fois le cordon testiculaire. Coupez le cordon chez les bovins et les buffles

**en frottant lentement le couteau de haut en bas. Tirez le cordon pour le détacher chez les agneaux et les cabris.**

- **Ne placez pas les doigts à l'intérieur du scrotum ouvert. Mettez de la teinture d'iode, du violet de gentiane ou une poudre antibiotique (voir R1, R5, R8, annexe 1) sur la blessure.**




### **La castration à la pince de Burdizzo (sans saignement)**

**La pince de Burdizzo doit être utilisée sur le jeune animal. Il existe des pinces de Burdizzo pour des animaux de différentes tailles. Vous ne devez jamais oublier que la pince de Burdizzo est un instrument précieux: vous devez le garder propre et huilé. Ne le laissez pas tomber. Pour pratiquer la castration à la pince de Burdizzo:**

- **Tâtez le scrotum avec votre main et vous sentirez les deux cordons testiculaires à l'intérieur.**
- **Prenez la pince de Burdizzo dans votre main droite et, avec votre main gauche, poussez le cordon sur le côté entre les mâchoires de la pince et serrez fortement.**
- **Prenez ensuite la pince de Burdizzo dans la main gauche et écrasez l'autre cordon.**

### **La castration à la pince de Burdizzo (sans saignement)**

Pince de Burdizzo pour  
les veaux



Pince de Burdizzo  
pour les ovins



## La castration au moyen d'anneaux constricteurs en caoutchouc


Pour pratiquer la castration avec des anneaux constricteurs en caoutchouc, nous employons un outil spécial qui ne peut être utilisé que pour châtrer des ruminants âgés seulement de quelques jours.

- Placez un anneau en caoutchouc autour des quatre mâchoires de l'outil et serrez la poignée. L'anneau en caoutchouc sera tendu en position ouverte.
- Faites passer le scrotum de l'animal à travers l'anneau en veillant bien à ce qu'il passe au-dessus des deux testicules.
- Relâchez l'outil et l'anneau en caoutchouc va serrer les cordons. Au

**bout de deux semaines, le scrotum se détachera.**

## **La castration au moyen d'anneaux constricteurs en caoutchouc**

Outil spécial



Anneaux  
constricteurs  
en caoutchouc



***Inspectez tous les animaux qui ont été récemment châtrés afin de déceler tout signe d'infection.***

### **Module 15: Les parasites internes (endoparasites) des ruminants**

***Des vers de petite taille peuvent infecter les ovins, les bovins, les caprins et les buffles et vivre dans l'intestin, les poumons, le foie et le sang de l'animal.***

***Ces vers sont appelés parasites, et l'animal dans lequel ils vivent est appelé hôte. Le parasite se nourrit de l'hôte, qui s'affaiblit, perd du poids, tombe malade et peut mourir.***

### **Objectifs d'apprentissage**

## **Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Ce qu'est un parasite.**
- 2 Comment les animaux sont infectés.**
- 3 Quels sont les problèmes causés par les parasites.**
- 4 Comment combattre les parasites.**

### **Qu'est-ce qu'un parasite?**

**Un parasite vit dans un autre animal ou sur lui et il s'en nourrit. Tous les animaux et tous les êtres humains peuvent être infectés par des parasites. Les ruminants peuvent être infectés par plusieurs types de vers.**

**Les ascarides (nématodes) sont petits et souvent de couleur blanche; ils ressemblent à des fils. On trouve différents ascarides dans toutes les parties de l'intestin et dans les poumons.**

**Les ténias sont longs et plats; ils ressemblent à des rubans blancs. Ils se composent de nombreux segments et vivent dans l'intestin.**


**Les douves sont plates et ressemblent à des feuilles; elles vivent dans le foie. Les schistosomes sont petits et ressemblent à des vers. Les douves et les schistosomes infectent les animaux élevés sur des terrains humides et marécageux car leurs œufs se développent dans l'eau.**

### **Qu'est-ce qu'un parasite?**





Ascarides



Ténia



Douve



Schistosomes

### Comment les animaux sont-ils infectés par des parasites?

Les ascarides, douves et schistosomes pondent des œufs qui sont expulsés de l'animal dans les déjections et tombent sur l'herbe. Les ténias produisent des œufs dans les segments qui se détachent et sont expulsés dans les déjections. Les animaux s'infectent quand ils broutent l'herbe.

### Comment les animaux sont-ils infectés par des parasites?



### Les effets des parasites sur l'animal

**Les parasites se nourrissent des aliments dans l'intestin et du sang de l'hôte. L'animal s'affaiblit et perd du poids ou n'en prend pas. Il peut avoir la diarrhée qui, chez les ovins, mouille la laine et attire les mouches.**

**A la longue, l'hôte s'affaiblit tellement qu'il meurt. Les jeunes animaux sont particulièrement sensibles aux parasites.**

### **Lutte contre les parasites**

**Nous pouvons combattre les parasites:**

- **En tuant les vers à l'intérieur de l'organisme.**
- **En réduisant le risque pour l'animal de s'infecter dans les pâturages.**

**On peut tuer les vers à l'intérieur de l'hôte en administrant à celui-ci un médicament (voir R11, annexe 1). Les médicaments sont administrés sous forme de breuvage ou de comprimés ou par injection. Demandez à votre vétérinaire quand et avec quelle fréquence vous devez traiter vos animaux.**

**Pour réduire les risques d'infection chez les animaux:**

- **Si possible, transférez le bétail à un nouveau pâturage toutes les semaines ou toutes les deux semaines.**
- **Il faut séparer les jeunes animaux des animaux plus âgés et les laisser paître l'herbe fraîche en premier.**
- **Si des bovins, des ovins et des caprins sont élevés dans la même zone,**

**laissez les bovins paître l'herbe avant les ovins, car certains vers qui infecteraient les ovins n'infectent pas les bovins.**

- **Si les animaux sont élevés dans un enclos, le ramassage et l'élimination des déjections empêcheront les animaux d'absorber davantage de vers, ou d'autres animaux d'être infectés.**
- **Ne laissez pas les animaux paître sur un terrain marécageux ou dans des pâturages où l'herbe est très courte.**
- **Quand les animaux ont été traités, faites-les paître sur des herbages frais.**

***Parlez à votre vétérinaire local; il vous conseillera pour combattre et éliminer les parasites dans votre région. Vous devez le prévenir si de jeunes animaux ont la diarrhée ou une forte toux et s'ils meurent.***

## **Module 16: Les parasites externes (ectoparasites) des ruminants**

***Les ruminants peuvent être infectés par plusieurs parasites de la peau (parasites externes) qui se nourrissent de la peau et du sang de l'animal.***

***Les parasites provoquent la maladie et une perte de poids; ils peuvent entraîner la mort de l'animal.***

***Les parasites peuvent aussi être porteurs d'autres infections et propager les maladies d'un animal à l'autre. Certaines de ces maladies peuvent être mortelles.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**


- 1 Quels parasites on peut trouver sur les ruminants.**
- 2 Quels sont les problèmes causés par une infection due à des parasites.**
- 3 Comment traiter et combattre l'infection due aux parasites.**

### **Les parasites**


**Tous les animaux et tous les êtres humains peuvent être les hôtes de parasites qui vivent sur la peau. Ces parasites ressemblent à des insectes.**

**Les acariens sont très petits et ne peuvent pas être distingués sans microscope. Ils vivent sur la peau où ils pondent leurs œufs.**

**Les poux sont assez gros pour être visibles. L'homme peut être infecté par le pou de la tête. Les bovins, les buffles, les ovins et les caprins peuvent être infectés par différents poux qui s'attaquent au corps, aux pattes ou à la région de la queue. Les poux vivent sur la peau, dans les poils ou la laine; ils y pondent leurs œufs appelés lentes.**




**Les tiques sont plus grandes que les poux; elles atteignent parfois la taille de l'ongle. Les jeunes tiques ont six pattes, tandis que les adultes en ont huit. Toutes les tiques se nourrissent du sang de l'hôte, puis se détachent et tombent dans l'herbe. Elles pondent leurs œufs sur le sol. Certaines tiques ne vivent que sur un seul hôte, tandis que d'autres peuvent vivre sur deux ou trois animaux différents pendant toute la durée de leur vie.**



### **Problèmes causés par les parasites externes**

**Les acariens sont responsables de la gale. Ils infectent la tête, les pattes, le corps ou la région de la queue, provoquant des croûtes sur la peau et la chute des poils et de la laine. Il y a des démangeaisons dans la zone infectée et l'animal se gratte. L'hôte ne se nourrit pas bien. Les infections entraînent la perte de laine précieuse chez les ovins et endommagent la peau des bovins et des caprins.**

**Parfois, les jeunes animaux sont infectés par une maladie de la peau appelée teigne. La teigne provoque des dépilations circulaires recouvertes de pellicules farineuses blanchâtres, mais sans démangeaison. Les animaux peuvent avoir à la fois la gale et la teigne, et de grandes surfaces de la peau peuvent être atteintes.**



**Les poux provoquent aussi une irritation de la peau; l'animal se gratte, se frotte et mord les régions infectées. L'hôte perd du poids ou n'en prend pas et il paraît en mauvais état. Les poux et les acariens peuvent être transmis d'un animal à l'autre. Le fait que l'animal se mord et se gratte est le premier signe d'infection. En examinant l'animal, vous pourrez savoir si le problème cutané est dû à des poux ou à des acariens. Si l'animal est porteur de poux, vous en trouverez sur son pelage; si vous n'en distinguez pas, l'animal a probablement la gale causée par des acariens.**

**Les tiques sont des parasites très importants. Elles mordent l'hôte et sucent son sang et, quand elles sont pleines, elles se laissent tomber dans l'herbe où elles peuvent vivre pendant plusieurs mois sans se nourrir. Les animaux peuvent être intoxiqués ou paralysés par les morsures de certaines tiques. D'autre part, les tiques propagent des maladies qui peuvent entraîner la mort de l'hôte. Les tiques provoquent la perte de viande, de laine, de lait et de cuir.**

### **Traitement et moyens de lutte**

**On combat les acariens et les poux en lavant la zone infectée, en effectuant des**

**pulvérisations ou en faisant passer l'animal dans un bain de déparasitage (voir «Pulvérisations» et «Bains de déparasitage», annexe 3) avec un traitement approprié (voir R15, annexe 1). Pour que ces moyens de lutte réussissent, il faut que tout le troupeau soit traité. Certains animaux peuvent être infectés sans manifester de signes d'infection; les parasites se propageront à d'autres animaux s'ils ne sont pas traités également.**

**Si un animal n'est porteur que de quelques tiques, celles-ci peuvent être soigneusement arrachées, mais il faut bien veiller à ce que les pièces buccales de la tique soient retirées. Si l'on frotte les tiques avec un chiffon trempé dans de l'essence, elles se détacheront de l'hôte et tomberont. On peut traiter de grands nombres de tiques en utilisant des pulvérisations et des bains de déparasitage (voir R16, annexe 1). Il faudra alors traiter la totalité du troupeau.**

**En transférant les animaux à d'autres pâturages et en laissant reposer pendant un certain temps la prairie contaminée, on peut combattre les tiques. Un autre moyen utile à cet égard consiste à couper les buissons et à labourer la zone atteinte. On peut trouver un grand nombre de tiques autour des points d'eau et des abris pour animaux. L'élevage de volailles dans ces zones peut contribuer à réduire le nombre de tiques car les oiseaux les dévoreront.**

***Si la gale ou les tiques posent un problème pour le bétail dans votre communauté, vous devez en parler à votre vétérinaire local. Il vous conseillera le meilleur traitement et les meilleurs moyens de lutte à utiliser dans votre région. Il vous demandera peut-être de recueillir quelques tiques ou de prélever des lambeaux de peau sur les animaux atteints de la gale afin de pouvoir identifier le parasite. Il pourra ainsi décider plus facilement du traitement à appliquer.***



## **Module 17: Les signes de rut ( chaleurs ou œstrus) chez les ruminants**

***Le rut ou œstrus est la période pendant laquelle la femelle accepte le mâle pour s'accoupler.***

***Il existe des signes qui indiquent l'œstrus chez tous les ruminants. Si vous reconnaissez quand la femelle est en chaleur, vous saurez quand il faut la mettre avec le mâle ou pratiquer l'insémination artificielle.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Ce qu'est le rut ou œstrus.**
- 2 Quand une femelle est parvenue à maturité et est en rut (en chaleur).**
- 3 Quels sont les signes du rut chez les différents ruminants.**
- 4 Quelle est la durée de l'œstrus chez les différents animaux.**

### **Qu'est-ce que le rut?**

**Chez la femelle, les organes de reproduction (voir module 3) se composent de deux ovaires et de l'utérus. De temps à autre, les ovaires produisent des œufs minuscules (ovules). Cette époque est appelée rut ou chaleurs ou œstrus.**

**Les bovins et les buffles sont en rut périodiquement pendant toute l'année. La plupart des ovins et des caprins sont en rut à une certaine époque de l'année (époque de la reproduction).**

## **Savoir quand un animal est en rut**

**Si vous savez qu'une femelle est en rut, vous pouvez la présenter au mâle que vous avez choisi pour l'accouplement, ou bien vous pouvez prendre des dispositions en vue de l'insémination artificielle si c'est possible. Vous pourrez aussi identifier les animaux qui ne sont pas en rut.**

**Pour rechercher les signes indiquant que la femelle est en rut, le meilleur moment est le début de la matinée ou la soirée. Veillez bien à ne pas déranger les animaux; observez-les simplement pour repérer les signes du rut.**

### **Les signes du rut**


**Les ruminants peuvent être au pâturage, ou bien à l'étable ou attachés la plupart du temps. Il est donc nécessaire d'en tenir compte quand on recherche les signes du rut:**

#### **1 Les signes du rut chez les animaux en liberté (au pâturage):**

- **La plupart des femelles en rut laissent d'autres animaux les monter.**
- **Les vaches en rut montent les unes sur les autres, de l'arrière ou du devant. (Il se peut toutefois que la vache qui monte ne soit pas en chaleur).**
- **La vulve est tuméfiée et la région entourant la queue devient humide et souillée.**

- **Si des vaches se reniflent mutuellement la vulve et l'urine, elles peuvent toutes deux approcher du rut.**
- **Les vaches peuvent approcher du rut si elles se tiennent le menton appuyé sur le dos d'une autre, ou bien si on les voit se lécher mutuellement ou se cogner légèrement de la tête.**

### **Les signes du rut**



- **Le fait de s'agiter ou de meugler fortement peut aussi indiquer que la femelle approche du rut. Les chèvres en particulier deviennent très bruyantes.**

## **2 Les signes du rut chez l'animal en étable ou attaché:**

**Il faut laisser les animaux sortir deux fois par jour; on peut alors les observer pour déceler les signes de rut. Si on ne laisse pas la femelle sortir, les signes suivants indiqueront qu'elle est en rut:**

- **La vulve tuméfiée.**
- **L'animal est actif, il manque d'appétit et meugle fortement.**
- **Chez les animaux en lactation, la quantité de lait produite diminue soudainement.**
- **On distingue au sol, dans la bouse, une mucosité gélatineuse.**

**Il vous faudra pouvoir reconnaître les différences entre les signes de rut et les signes de mauvaise santé chez l'animal attaché.**

**Quand les animaux sont-ils en rut pour la première fois?**

**Les animaux approchent du rut quand ils atteignent la puberté. L'âge de la puberté diffère selon les types de ruminants:**

- **Les vaches et les bufflonnes bien nourries sont en chaleur pour la première fois à l'âge de 10 à 20 mois.**
- **Les brebis et les chèvres sont en chaleur pour la première fois à l'âge de 6 à 12 mois.**

**Quelle est la durée du rut?**

## La durée du rut est très courte:

- Chez les vaches et les bufflonnes, elle est inférieure à un jour.
- Chez les chèvres, le rut dure de un à trois jours.
- Chez les brebis, le rut dure de un à deux jours.

Un animal sain qui n'a pas été monté par un mâle, ou sur lequel on n'a pas pratiqué l'insémination artificielle, sera de nouveau en rut. Les vaches et les bufflonnes seront de nouveau en rut après trois semaines (à un ou deux jours près) et les chèvres et les brebis après 17 jours (à un ou deux jours près).

## La femelle qui n'est pas en rut

Il se peut qu'une femelle n'accuse aucun signe de rut parce qu'elle est trop âgée ou parce qu'elle a déjà été montée à l'insu de l'éleveur. Parfois, les animaux sont en rut sans qu'il y ait aucun signe. Ce rut, dit «asymptomatique», est fréquent chez les bufflonnes. Si le fourrage est insuffisant ou s'il y a pénurie de protéines, de sels ou d'eau, le rut peut ne pas se produire. Pour provoquer le rut, il vous faudra améliorer le fourrage de la femelle.

*Si le rut ne survient pas chez de jeunes femelles bien nourries ou si celles-ci ne deviennent pas gravides, vous devez demander conseil à votre vétérinaire local.*

## Module 18: La gestation chez les ruminants

***Quand les animaux s'accouplent, le spermatozoïde du mâle rejoint les ovules dans l'utérus.***

***Le rut prend alors fin, et le ventre de la femelle grossit pendant plusieurs mois à mesure que le petit se développe durant la gestation.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Ce qui se passe pendant la période de gestation.**
- 2 Quels sont les signes de gravidité.**
- 3 Comment vous occuper de l'animal gravide.**

## **Qu'est-ce que la gestation?**

**Quand le mâle s'accouple avec la femelle, il dépose des spermatozoïdes le vagin. Le spermatozoïde rejoint l'ovule pour former l'embryon, qui se fixe à la paroi de l'utérus. L'embryon grandit à l'intérieur d'un sac rempli de liquide (la poche des eaux); il est fixé à la paroi de l'utérus par le cordon ombilical.**

## **Les signes de gravidité**

**Le rut cesse quand débute la gestation. L'animal devient plus tranquille et son ventre enfle. Chez les animaux laitiers, la production de lait diminuera progressivement.**

## **Durée de la gestation**

**Si on a laissé les animaux mâles et femelles ensemble dans un grand troupeau, il sera difficile de déterminer la date prévue de la mise bas (parturition). En**

**revanche, si vous savez quand une femelle a été montée ou a subi une insémination artificielle, vous pouvez déterminer la date où elle mettra bas.**

**La durée de la gestation diffère selon les animaux.**

<b>Animal</b>	<b>Durée de la gestation</b>
<b>Vache</b>	280 jours
<b>Bufflonne</b>	320 jours
<b>Brebis</b>	150 jours
<b>Chèvre</b>	150 jours

***Il peut y avoir un écart de quelques jours en plus ou en moins selon le type d'animal, le climat, l'affouragement et d'autres facteurs.***

### **Conduite de l'animal gravide**

**Vous ne devez pas oublier qu'un animal gravide aura besoin de plus de nourriture et qu'il est bon d'ajouter un peu de céréales au fourrage vers la fin de la gestation. Tous les animaux gravides doivent rester à proximité de l'éleveur vers la fin de la période de gestation, et il faut prévoir un abri. Il faut surveiller les animaux deux fois par jour pour voir si les signes de parturition sont proches. Les vaches et les bufflonnes en particulier ont besoin d'un endroit propre et bien ventilé, de préférence avec un sol sablonneux recouvert d'une litière appropriée.**

**Ne tenez pas une bête gravide constamment attachée ou avec trop peu d'espace pour faire de l'exercice. Laissez-la chaque jour en liberté dans un pâturage ou une**



**cour. Il faut l'observer de près deux fois par jour pour déceler tous signes de parturition.**

## **Module 19: Vêlage (parturition)**

***Le vêlage est un processus naturel qui se déroule normalement sans assistance. Une observation étroite s'impose au cas où la vache aurait des difficultés.***

***Les problèmes tendent à être plus nombreux chez les vaches qui mettent bas pour la première fois (génisses) que chez les vaches plus âgées; il faut donc faire plus attention avec les génisses.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez pouvoir:**

- 1 Reconnaître les signes du vêlage.**
- 2 Reconnaître un vêlage normal.**
- 3 Aider une vache qui a du mal à vêler.**
- 4 Vous occuper de la vache immédiatement après le vêlage.**
- 5 Vous occuper du veau nouveau-né.**

### **Les signes du vêlage**

**Vous saurez que la vache est sur le point de vêler ou de mettre bas quand vous observerez ce qui suit:**

- La taille du ventre a augmenté, surtout sur le flanc droit.**

- **La mamelle enfle et les trayons se raidissent.**
- **La vulve devient rouge et tuméfiée, avec présence d'un liquide couleur de sang et contenant des mucosités.**
- **L'animal est agité.**
- **La poche des eaux apparaît à la vulve.**

### **Vêlage normal**

**La poche des eaux apparaît à la vulve. La vache pousse davantage. La tête du veau apparaît, ce qui rompt la poche. Vous pourrez alors voir les deux pieds de devant du veau. Le vêlage atteint ce stade au bout de 4 à 6 heures. Chez les génisses, la durée peut être plus longue. Quand le thorax traverse le vagin, le veau commence à respirer.**

### **Vêlage normal**



***Il est préférable de laisser la vache tranquille pour qu'elle mette bas naturellement.*** Néanmoins, si vous voulez l'aider à vêler, vous pouvez tirer doucement les pieds du veau. Si le cordon ombilical (voir module 18) est encore attaché à la vache, vous pouvez le couper avec un couteau propre bien aiguisé ou une paire de ciseaux, puis badigeonner de teinture d'iode ou d'alcool l'extrémité du cordon. Parfois, les membres postérieurs du veau apparaissent d'abord. En regardant de près, vous pourrez distinguer les membres postérieurs des pattes de devant. Vous observerez que les membres postérieurs sortent de la vulve avec la sole des pieds tournée vers le haut. Vous devrez alors rechercher (éventuellement en tâtant à la main) la queue et les jarrets.


## Difficultés au vêlage

Laissez l'animal mettre bas naturellement. En cas de difficultés, vous constaterez peut-être:

- (1) Que seule apparaît la tête du veau.
- (2) Que la tête et un seul pied apparaissent.
- (3) Qu'on voit les deux membres antérieurs mais pas la tête.

Si cela se produit, vous devez soit solliciter l'assistance du vétérinaire, soit aider la vache vous-même.

### Difficultés au vêlage




Il vous faudra du savon, de l'eau chaude, une corde propre et de l'huile végétale propre, par exemple de l'huile d'olive ou de tournesol. Lavez la région de la vulve

**et lavez-vous bien les mains. Veillez à ce que vos ongles soient courts et parfaitement propres. Des ongles trop longs peuvent blesser l'animal. Si vous avez de l'huile, mettez-en sur la main et le bras; sinon, savonnez-vous la main et introduisez-la dans le vagin pour voir ce qui ne va pas.**

**Il vous faudra reconnaître la différence entre les membres antérieurs et postérieurs du veau dans l'utérus. Touchez le boulet, puis remontez la main le long de la patte jusqu'à l'articulation suivante. Il y aura l'articulation du genou sur le membre antérieur et le jarret sur le membre postérieur. Poussez le veau sur le côté ou repoussez-le dans l'utérus afin de pouvoir rectifier sa position et de placer la tête et les pattes au bon endroit pour la naissance.**

### Difficultés au vêlage



**Une fois la tête et les pattes du veau dans la bonne position, attachez une corde propre autour des deux pieds. Tirez doucement sur la corde. Il vous faudra peut-**

**être quelqu'un pour vous aider.**

***Il peut arriver que la poche des eaux crève sans qu'apparaissent ni les pieds ni la tête. C'est là une situation à laquelle il est difficile de remédier et, si vous le pouvez, vous devez immédiatement demander à votre vétérinaire de vous aider.***

**Comment soigner la vache après le vêlage**

**Donnez à la vache de l'eau propre à boire immédiatement après qu'elle a vêlé car elle aura soif.**

**Le placenta sera expulsé naturellement, mais vous pouvez aider en tirant doucement dessus. Il faut que le placenta ait été expulsé dans les 24 heures qui suivent la mise bas; s'il reste dans l'utérus, il causera une infection et vous devrez rechercher l'aide du vétérinaire.**

**Comment s'occuper du veau nouveau-né**

**Manipulez toujours le veau avec précaution. Nettoyez-lui le mufle et la bouche pour retirer les mucosités (liquide gluant) et vérifiez que le veau respire normalement. S'il ne respire pas, vous devez intervenir immédiatement:**

- **En pompant le thorax avec la paume de la main.**
- **En maintenant la tête du veau plus bas que son dos.**
- **En introduisant une paille dans ses naseaux pour le faire éternuer et déclencher la respiration.**

**Laissez le veau téter sa mère le plus tôt possible afin qu'il absorbe le colostrum,**

**c'est-à-dire le lait jaunâtre qui est produit immédiatement après la naissance. Le colostrum est riche en protéines et protège le veau contre la maladie.**

**Certaines personnes prennent le colostrum pour s'en nourrir, mais il est très important que le veau soit robuste et en bonne santé, et c'est pourquoi il faut le lui laisser.**

***Vous devez laisser le veau prendre le colostrum pendant au moins quatre jours après sa naissance.***

## **Module 20: Mise bas des agneaux et des cabris**

***Agneler et chevrotter sont des processus naturels, comme le vêlage; normalement, ils se déroulent sans assistance, mais l'observation s'impose en cas de difficultés.***

***Contrairement aux vaches et aux bufflonnes, les brebis et les chèvres ont fréquemment des jumeaux (deux petits) ou des triplés (trois petits).***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez pouvoir:**

- 1 Reconnaître les signes que la parturition commence.**
- 2 Reconnaître quand la parturition est normale.**
- 3 Aider la parturition si c'est nécessaire.**
- 4 Vous occuper de la mère et du nouveau-né.**


## **Les signes de la parturition**

**Les signes suivants vous indiqueront que la chèvre ou la brebis est sur le point de mettre bas:**

- **L'animal se tient à l'écart des autres.**
- **La vulve est tuméfiée et la peau fait des replis.**
- **L'animal paraît agité et ne mange pas bien.**
- **Un écoulement provenant de la vulve se produit quelques jours avant la parturition.**
- **La brebis se couche en tendant le cou en arrière pour regarder en l'air et elle se lèche les lèvres.**
- **La brebis pousse pour faire sortir l'agneau.**

**L'animal regarde en l'air**





## **Parturition normale**

**Les animaux peuvent mettre bas debout ou couchés. La tête et les deux membres antérieurs apparaissent, mais parfois les deux membres postérieurs apparaissent. Si la mère est jeune, la mise bas peut lui poser des problèmes.**

## **Quand et comment aider à la parturition**


**Comme pour le vêlage (voir module 19), il se peut que le petit soit dans une position anormale et que la naissance soit difficile. Si vous désirez aider, il vous faut du savon et de l'eau propre. Lavez-vous les mains et les ongles, puis lavez la région autour du vagin. Savonnez-vous bien les mains et introduisez une main dans le vagin. Quand vous aurez découvert quel est le problème, rectifiez la position de l'agneau ou du cabri afin qu'il puisse naître. En recherchant**

**doucement les articulations des pattes par tâtonnements, vous saurez dans quel sens se présente l'animal.**

**Vous pouvez tenir la tête, mais ne tirez pas l'agneau par la mâchoire car celle-ci se briserait. Vous pouvez utiliser une corde propre en l'attachant autour de la patte au-dessus du boulet. Tirez la corde vers le bas pendant que la brebis pousse.**

**Si l'utérus contient des jumeaux ou des triplés, vous aurez du mal à distinguer à quel animal appartient telle ou telle patte. Essayez de retirer d'abord le petit qui se trouve le plus près du vagin. Un animal qui vient de naître doit chercher à respirer immédiatement; s'il ne respire pas, vous pouvez lui introduire une paille dans le naseau pour stimuler la respiration. Si vous le tenez par les membres postérieurs en le balançant doucement, cela fera sortir les mucosités qui pourraient obstruer la bouche et les poumons.**

**Quand et comment aider à la parturition**



### Soins à donner à la mère et au nouveau-né

Dès qu'elle a mis bas, il faut donner à la mère de l'eau fraîche bien propre. Vérifiez qu'elle produit du lait par les deux trayons et laissez le petit téter le colostrum (voir module 19).

*Si les trayons d'une chèvre sont rendus gras par le lait, le cabri peut éprouver des difficultés à téter. Faites sortir un peu de lait en appuyant sur les trayons, afin que les cabris puissent téter facilement. Si la chèvre a mis bas des triplés, essayez de*

***faire allaiter l'un d'eux par une autre chèvre (voir module 21).***

**Si la mère a eu des difficultés à mettre bas, vérifiez qu'il ne reste pas d'agneau ou de cabri mort dans l'utérus. S'il y en a un, retirez-le car il causerait une infection qui tuerait la mère.**

**Le placenta doit être expulsé dans les 3 heures qui suivent la mise bas. Si cela ne s'est pas produit au bout de 14 heures, il vous faudra obtenir l'aide du vétérinaire. Il y aura un placenta pour chacun des petits que la mère a mis au monde.**

## **Module 21: Soins au nouveau-né**

***Dès la naissance, le jeune animal est vulnérable à la maladie. Il dépend totalement de sa mère pour s'alimenter; si la mère meurt, l'orphelin aura besoin d'une nourrice pour survivre.***

***Les opérations telles que la castration, le tronçonnage et le décornage doivent être pratiquées à un âge très précoce pour éviter les risques inutiles et provoquer moins de stress chez l'animal.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Vérifier le cordon ombilical du nouveau-né.**
- 2 Vérifier la présence de trayons en surnombre chez les petits.**
- 3 Mettre en nourrice les orphelins.**
- 4 Soigner les orphelins.**

## **5 Nourrir les nouveau-nés.**

### **Vérification du cordon ombilical**

**L'idéal est d'appliquer sur le cordon ombilical de l'animal qui vient de naître la teinture d'iode ou du violet de gentiane, immédiatement après la naissance. Cette opération doit être renouvelée deux ou trois jours plus tard. Au bout d'une semaine, le cordon devrait être desséché et tomber de lui-même. S'il y a une infection, il faut la traiter comme une plaie (voir module 73).**

### **Vérification de la présence de trayons en surnombre**

**Certains ruminants femelles naissent avec un ou plusieurs trayons en surnombre. C'est souvent le cas chez les veaux.**

**Les trayons en surnombre peuvent être supprimés ainsi:**

- **Immobilisez fermement l'animal.**
- **Repérez les trayons en surnombre qu'il faut supprimer.**
- **Utilisez une paire de ciseaux propres et bien aiguisés pour couper les trayons au ras de la peau.**
- **Désinfectez la blessure avec de la teinture d'iode ou une poudre antibiotique.**

### **Mise en nourrice**

**Il est nécessaire de mettre le jeune animal en nourrice si sa mère biologique est morte ou ne produit pas assez de lait. La brebis ou la chèvre ne peut nourrir correctement que deux petits; s'il y en a un autre, il devra être mis en nourrice. Il faut procéder ainsi:**

- **Si la mère nourricière a perdu un petit, retirez la peau du petit qui est mort et attachez-la autour de l'orphelin. Au bout de quelques heures, enlevez la peau.**
- **Frottez l'orphelin avec le placenta ou sous la queue d'une mère qui vient de mettre bas. Laissez l'orphelin téter avec le dos tourné vers la tête de la mère, afin qu'elle puisse le sentir. Cette méthode est surtout utilisée avec les brebis et les chèvres.**
- **On peut attacher la mère nourricière par la tête dans un petit enclos ou un local, en laissant l'orphelin avec elle. Généralement, l'orphelin tétera si on empêche la mère nourricière de lui donner des coups de pied ou de s'en aller. Cette méthode peut être utilisée avec les brebis et les chèvres, mais elle donne aussi de bons résultats avec les vaches et les bufflonnes. Dans le cas des grands ruminants, en attachant une corde autour du ventre de la mère, on l'empêchera de donner des coups de pied au veau qui la tête.**
- **Mettez l'orphelin et la mère nourricière dans un petit local ou un enclos avec un chien, attaché ou non. La femelle protégera l'orphelin du chien et le laissera la téter.**


## **Allaitement des orphelins à la main**

**Si on ne dispose d'aucune mère nourricière, il faudra allaiter l'orphelin à la main. Vous devrez veiller à ce que l'orphelin absorbe bien du colostrum, si possible pendant quatre jours ou huit tétées. Prélevez le colostrum sur d'autres mères et placez-le dans un biberon propre. Ne faites pas bouillir le colostrum car il tournerait.**

**On peut donner du lait chaud aux agneaux et aux cabris avec un biberon muni d'une tétine en caoutchouc. Nettoyez bien le biberon après chaque tétée. Les animaux ont besoin de quatre à six tétées par jour.**

**Les veaux peuvent aussi être nourris au biberon, mais il est préférable de les habituer à boire le lait dans un seau dès qu'ils sont âgés de quelques jours. Pour obtenir du veau qu'il boive dans un seau, faites-le sucer vos doigts puis, pendant qu'il suce, enfoncez la main progressivement dans le seau de lait. Procédez ainsi plusieurs fois en tenant le seau à hauteur de genoux et le veau ne tardera pas à se nourrir au seau. Le veau devra être nourri trois ou quatre fois par jour. Nettoyez et lavez tous les biberons et tous les seaux après chaque repas.**

## **Allaitement des orphelins à la main**



## **L'alimentation des veaux**

**Il faut un certain temps pour que l'estomac du veau se développe pleinement et soit capable de digérer les plantes. Au début, il ne peut digérer que le lait; un veau âgé de 2 mois boit de 4 à 6 litres de lait par jour. Pendant les deux premiers mois de sa vie, il faut laisser le veau prendre à sa mère tout le lait dont il a besoin.**

**A partir de l'âge de 3 semaines, un veau commence à manger un peu d'herbe et dès l'âge de 3 mois il peut manger des plantes et ruminer. A cet âge-là, le veau peut être sevré. On le laisse prendre moins de lait et on lui donne des aliments solides en quantité croissante jusqu'à ce qu'il cesse de boire du lait. Le veau peut recevoir des céréales pendant le sevrage. Si le veau reste avec sa mère, il ne sera pas totalement sevré avant l'âge de 8 à 12 mois.**



## L'alimentation des agneaux et des cabris

Les agneaux et les cabris téteront leur mère jusqu'à l'âge de 4 mois, mais ils commenceront à s'intéresser aux plantes vertes dès l'âge de 3 semaines.

*N'oubliez pas que la plupart des animaux nouveau-nés meurent par manque de nourriture. Le froid et l'humidité sont très mauvais pour le nouveau-né; ils peuvent causer des maladies des poumons qui risquent de tuer l'animal.*

## Module 22: La production de lait et la mamelle

***Le lait a pour but principal de nourrir les petits. Une bonne femelle laitière peut produire plus de lait qu'il n'en faut pour ses petits.***

### Objectifs d'apprentissage


Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:

- 1 Comment le lait est produit.
- 2 Pourquoi le rendement laitier est variable.
- 3 Quels sont les problèmes d'infection (mammite) du pis.
- 4 Comment utiliser le lait.

### Comment le lait est produit

La mamelle de la vache et de la bufflonne comporte quatre quartiers dont chacun a un trayon. Chez la brebis et la chèvre, la mamelle est divisée en deux avec deux trayons.

## Comment le lait est produit



**Le lait est produit dans la mamelle à partir des nutriments contenus dans le sang qui parcourt les vaisseaux dans chaque quartier. Plus la quantité de sang traversant la mamelle est grande, plus l'animal produit du lait. Le lait est libéré quand le trayon est sucé ou pompé.**

**La traite manuelle dure de 5 à 10 minutes. La mamelle doit se vider à chaque traite, ce qui la stimule à produire plus de lait. Il faut toujours traire l'animal au repos. Les heures qui conviennent le mieux à la traite sont le matin, avant que l'animal ne se rende au pâturage, et le soir. Il faut toujours traire à la même heure chaque jour.**

### **Différences de rendement du lait**

**Le rendement laitier peut varier pour différentes raisons:**

- **Certains types ou certaines races d'animaux produisent plus de lait que d'autres.**

- **La production de lait sera plus abondante après la naissance du deuxième ou du troisième petit.**
- **Pour produire du lait, l'animal en lactation a besoin d'un supplément de bon fourrage et de minéraux et de beaucoup d'eau.**
- **La production laitière s'améliore quand l'animal met bas pendant la saison des pluies car le fourrage est alors abondant.**
- **Pendant qu'on traite la brebis, la vache, la chèvre ou la bufflonne, il faut lui parler, chanter ou siffler car cela détend l'animal et le lait vient plus facilement.**
- **Certains sujets fournissent naturellement plus de lait que d'autres. Il faut sélectionner ces sujets pour la reproduction (voir annexe 4).**

### **Infection du pis (mammite)**

**Une mamelle en bon état est indispensable pour la production laitière. Si le pis subit une lésion ou une infection, la production de lait peut cesser. L'infection de la mamelle est appelée mammite; elle est causée par des germes. La mammite peut être dépistée ainsi:**


- **Le lait n'est pas propre, sa couleur a changé et il peut contenir des grumeaux.**
- **La mamelle est chaude, douloureuse et tuméfiée.**
- **La peau des trayons est fendillée.**
- **L'animal peut cesser de manger.**

**L'infection peut atteindre plus d'un quartier de la mamelle. La mammite peut être causée par un germe qui est infectieux et se propage à d'autres animaux. Le lait de chèvre doit être observé de près pour déceler les signes de mammite parce qu'il se peut que sa couleur ne change guère.**

**Pour enrayer la mammite ou réduire les risques d'infection, il faut prendre les mesures suivantes:**

- **La personne qui traite doit toujours avoir les mains propres.**
- **La mamelle doit être lavée à l'eau chaude et séchée avant la traite.**
- **Tout animal atteint de mammite (ou de quelque autre maladie) doit toujours être traité en dernier.**
- **Le traitement de la mammite réussira s'il est entrepris dès le début.**

### **Infection du pis (mammite)**



**Pour traiter la mammite, il faut laver la mamelle à l'eau chaude. On devra ensuite**

**évacuer le lait infecté de la mamelle en utilisant un cathéter à trayon propre ou par une traite manuelle. On procédera ainsi au moins deux fois par jour jusqu'à ce que la mamelle redevienne normale.**

**On accorde aujourd'hui la préférence à un traitement qui consiste à laver à l'eau froide le quartier touché, puis à en évacuer le lait. La mamelle est ensuite séchée et on la masse. On répète l'opération le matin et le soir jusqu'à ce que la mamelle redevienne normale, l'infection est grave, le traitement est renouvelé toutes les 2 à 3 heures.**

**Si l'infection persiste, il faut faire pénétrer de l'antibiotique à partir d'un tube (voir R19, annexe 1) dans le canal du trayon après chaque traite. En cas de mammite prononcée, vous pouvez pratiquer une injection d'antibiotique (voir R6, annexe 1).**

***Consultez le vétérinaire si la mammite pose un problème permanent ou se développe dans votre communauté.***

### **Moyens d'utilisation du lait**

**Le lait est différent chez les vaches, les chèvres, les brebis et les bufflonnes, mais il contient toujours des matières grasses, des protéines, des vitamines et des minéraux. Tous ces laits sont extrêmement précieux pour l'alimentation humaine. On peut se servir du lait pour fabriquer la crème, le beurre, le ghee, le yaourt et les fromages, ainsi que d'autres aliments.**

**Le lait est un bon aliment, mais il peut véhiculer des maladies. Il peut aussi être infecté par des germes provenant de la personne qui traite l'animal ou par des saletés se trouvant sur l'animal. Quiconque boit le lait sera alors infecté.**

**Si on garde le lait, il tourne et n'est plus bon à boire. Si on veut conserver le lait pendant la journée, il faut le faire bouillir toutes les 4 ou 5 heures et le conserver dans un récipient propre à couvercle. Si on veut conserver le lait jusqu'au lendemain, il faut le faire bouillir et le placer, dans son récipient propre à couvercle, dans un endroit frais hors de la portée des chats, des rongeurs et des insectes. Il faut le faire bouillir de nouveau le matin avant de l'utiliser.**

**Pour empêcher que le lait ne propage des maladies:**

- **N'utilisez que du lait provenant d'animaux en bonne santé.**
- **Lavez et séchez le pis de l'animal avant la traite et lavez-vous bien les mains avant de le traire.**
- **Jetiez toujours le premier lait qui sort du trayon car il peut contenir des germes.**
- **Faites bouillir le lait avant de le boire.**
- **Conservez le lait dans des récipients propres où l'on a fait bouillir de l'eau ou qui ont été lavés à l'eau chaude.**

## **Module 23: L'affouragement et l'abreuvement des ruminants**

***Pour tirer le maximum de votre bétail, vous devez toujours donner aux animaux suffisamment de bon fourrage et d'eau saine.***

***Le bon fourrage est riche en nutriments et fournit à l'organisme tout ce dont il a***

***besoin pour que l'animal se développe et puisse se reproduire.*****Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quels sont les nutriments dont les animaux ont besoin dans leur fourrage.**
- 2 Ce qu'est une ration journalière.**
- 3 Ce que sont les fourrages grossiers et les aliments concentrés.**
- 4 Quel fourrage donner pendant la saison sèche.**
- 5 Quels sont les arbres fourragers.**

**Ce dont un animal a besoin dans sa nourriture**

**Pour rester en bonne santé, avoir de l'énergie, grandir et se reproduire, tous les animaux et les êtres humains ont besoin que leur nourriture contienne les nutriments qu'on appelle glucides, protéines, lipides (matières grasses), vitamines et minéraux.**

**Les glucides comme le sucre et l'amidon (féculents) sont brûlés dans l'organisme pour donner de l'énergie. Les graisses se décomposent dans l'organisme pour fournir des glucides et de l'eau. Les animaux et les êtres humains emmagasinent les glucides dans l'organisme sous forme de graisse.**

**Les protéines forment les éléments constitutifs de l'organisme. Elles sont nécessaires pour produire les muscles.**

**Les minéraux comme le cuivre et le calcium sont nécessaires pour former les os, le cerveau, les nerfs et le sang. Les végétaux absorbent les minéraux à partir du sol. Les vitamines sont indispensables pour assurer à l'organisme une bonne santé; les végétaux contiennent tous plusieurs vitamines.**

**Si les animaux manquent d'un nutriment, ils deviennent moins productifs et risquent de mourir de ce qu'on appelle une maladie de carence.**

**Si un animal ne reçoit pas suffisamment de matières grasses, de protéines ou de glucides dans son fourrage, il ne peut pas grandir correctement, il perd du poids, la production de lait diminue et la reproduction est affectée. Le manque de minéraux crée des problèmes comme l'absence de rut, une mauvaise croissance des os et la chute des poils ou de la laine. Le manque de vitamines essentielles peut créer des problèmes comme la cécité et le gonflement des articulations.**

## **Types de fourrage**

**Un bon fourrage riche contient plus d'énergie qu'un fourrage médiocre: une vache tire autant d'énergie de 1 kg de sorgho, d'orge ou de maïs que de 6 kg d'herbe. Certains fourrages sont très médiocres et de peu d'utilité pour l'animal. Par exemple, la paille ancienne ne contient que peu d'énergie; la majeure partie ne peut pas être digérée et elle est évacuée de l'animal sous forme de bouse.**

- **Les fourrages grossiers sont un aliment de lest faible en glucides énergétiques. On peut citer comme exemples de fourrage grossier les herbages, les tiges de maïs et les sommités des patates douces.**
- **Les concentrés sont des aliments riches en protéines et en glucides, par**



## exemple les cultures céréalières.

**A cause de son grand estomac comprenant quatre compartiments, le ruminant peut se nourrir principalement de fourrages grossiers. Les animaux qui ont un seul estomac ont besoin de plus de concentrés que les ruminants.**

### Les rations

**On entend par ration journalière la quantité de fourrage dont un animal a besoin chaque jour. Une ration satisfaisante contiendra tous les nutriments. Certains nutriments se trouvent en grandes quantités dans quelques végétaux:**

Nutriments	Plantes
<b>Glucides</b>	<b>Maïs, sorgho, blé, avoine, riz, herbe</b>
<b>Protéines</b>	<b>Luzerne, trèfle, haricots, herbe</b>
<b>Matières grasses</b>	<b>Graines de coton, graines de tournesol, herbe, arachides</b>

**On peut citer comme exemple d'une ration satisfaisante, pouvant être donnée aux animaux qui ne sont pas au pâturage, une ration composée de trois parties de maïs, une partie de tournesol et une partie d'arachides non décortiquées. Cette ration est distribuée à raison de 2 à 3 pour cent du poids corporel chaque jour.**

**L'herbe verte en pleine croissance contient tous les nutriments, mais pendant la saison sèche l'herbe ne contient que peu de protéines et de vitamines. A cette époque, il est nécessaire de fournir du fourrage supplémentaire, afin d'éviter la perte de poids, de maintenir la production laitière à un niveau élevé et d'assurer la croissance et la reproduction. Il peut aussi s'avérer nécessaire de donner des**

## **minéraux à l'animal.**


### **Le fourrage pendant la saison sèche**

**Pendant la saison sèche, l'herbe se fait rare et elle ne contient que peu de nutriments. Quand les herbages sont abondants pendant la saison des pluies, qui est l'époque de croissance des végétaux, vous pouvez couper l'herbe et la stocker jusqu'à ce qu'on en ait besoin pendant la saison sèche. L'herbe peut être conservée sous forme de foin ou d'ensilage.**

**Le foin est de l'herbe séchée. Le meilleur foin est préparé à partir d'herbe jeune. Coupez l'herbe et laissez-la sécher au soleil pendant plusieurs jours en la retournant pour être sûr qu'elle soit complètement sèche, après quoi elle peut être stockée jusqu'à ce que l'on en ait besoin. N'essayez pas de faire du foin pendant la saison des pluies.**

**On appelle ensilage de l'herbe ou d'autres végétaux qui sont coupés quand ils sont verts et stockés à l'abri de l'air. Pour faire de l'ensilage, il vous faudra un récipient ou une fosse étanche pour y stocker l'herbe.**

### **Le fourrage pendant la saison sèche**



**Creusez une fosse de 2 m de profondeur et de 1,5 m à 2 m de largeur. Etalez de grosses pierres sur le fond du silo. Coupez l'herbe et remplissez le silo en la piétinant. Le silo doit être plein au bout de un à deux jours.**

**Quand le silo est rempli, couvrez le haut avec une feuille de plastique ou des pierres, puis étalez de la terre par-dessus pour empêcher l'eau et l'air de pénétrer. Laissez l'ensilage reposer pendant quelques mois avant de vous en servir. La qualité de l'ensilage dépend des plantes utilisées. L'ensilage se conserve bien et les animaux l'apprécient.**

### **Arbres fourragers**

**Dans certaines communautés, la population coupe traditionnellement des branches d'arbres pour nourrir leurs animaux. Nous savons maintenant que**

**certains arbres sont meilleurs que d'autres comme fourrage. Les arbres les meilleurs sont des légumineuses (Leucaena).**

**Ces arbres peuvent être plantés en rangées espacées de 4 m. D'autres cultures peuvent être intercalées entre les rangées d'arbres. Les feuilles et les branches des arbres peuvent être coupées pendant toute l'année et utilisées comme fourrage pour les animaux.**

**L'utilisation de ces arbres comme fourrage est avantageuse pour les raisons suivantes:**

- **Les feuilles des arbres fournissent aux animaux une nourriture satisfaisante pendant toute l'année.**
- **Les feuilles qui pourrissent forment une litière végétale riche en minéraux (engrais naturel) pour d'autres cultures.**
- **Les arbres fournissent du bois de feu et du bois d'œuvre et forment des coupe-vent.**
- **Les arbres empêchent l'érosion du sol et en améliorent la fertilité.**

***Interrogez votre agronome ou vétérinaire au sujet de l'utilisation des arbres fourragers.***

**Fourrages supplémentaires**

**On distribue des fourrages supplémentaires quand les herbages sont médiocres et**

**secs ou quand un animal est gravide, en lactation ou utilisé pour le travail.**

**Le meilleur aliment supplémentaire est le tourteau. Les tourteaux les moins coûteux sont formés des déchets provenant de la transformation des noix de coco, des arachides, des graines de coton et des noix de palme utilisées pour l'huile. Vous pouvez utiliser les tourteaux disponibles sur place quels qu'ils soient.**

## **L'eau**

**Les animaux ont besoin de beaucoup d'eau fraîche bien propre tous les jours. Donnez toujours de l'eau aux animaux avant de les nourrir et laissez-les boire au moins trois fois par jour. Les ruminants au pâturage peuvent être abreuvés tous les deux ou trois jours. Ne laissez pas les animaux se tenir debout dans l'eau lorsqu'ils s'abreuvent car cela peut favoriser la propagation des maladies. Le besoin d'eau varie selon le fourrage consommé et les conditions météorologiques.**

**On peut ajouter une pincée de sel à l'eau de boisson pour fournir des minéraux.**

**N'oubliez pas ceci:**

**Veillez à ne pas propager des maladies par l'entremise du fourrage et de l'eau. Maintenez les abreuvoirs et les auges biens propres et ne laissez pas les animaux manger du fourrage trop vieux ou moisi.**

**Ne modifiez le fourrage que progressivement. Prenez des précautions particulières quand vous introduisez un fourrage vert frais, afin d'éviter la météorisation.**

**De nouvelles méthodes mises au point pour nourrir les animaux sont appliquées dans de nombreux pays. Il s'agit notamment des méthodes suivantes:**

- **Distribution de paille traitée à l'urée. La paille est un fourrage pour ruminants pauvre en nutriments, mais si elle est mouillée avec de l'urée et recouverte pendant une semaine, elle devient plus nutritive.**
- **Pierres à lécher contenant de la mélasse, de l'urée et des minéraux. Ces pierres constituent un bon complément pour les ruminants qui les lèchent et absorbent ainsi les nutriments.**

**Vous devez parler aux membres de votre communauté afin de découvrir ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux. Votre vétérinaire ou vulgarisateur local vous conseillera sur les meilleurs types de fourrage que vous pouvez vous procurer localement et sur la façon de les utiliser pour le bétail dans votre communauté. Vous pourriez encourager votre communauté à stocker du foin ou de l'ensilage pour la saison sèche.**

## **Module 24: Aménagement des pâturages**

### ***L'aménagement des pâturages pour les troupeaux:***

- ***Évitera le surpâturage et la perte de sol par érosion.***
- ***Assurera une production maximale de fourrage sur les terres disponibles.***
- ***Aidera à combattre les parasites internes et externes.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Comment aménager les pâturages.**
- 2 Ce qu'on entend par pâturage tournant.**
- 3 Quelle est l'utilité d'une bonne gestion des pâturages.**

## **L'aménagement des pâturages**

**On entend par aménagement ou gestion des pâturages le contrôle du pacage par tous les animaux. L'herbe doit être broutée assez légèrement pour maintenir à un niveau plutôt bas la croissance des herbages parvenus à maturité, mais pas au point d'arriver au ras du sol. Si les animaux au pacage ne touchent pas à certains herbages, arrachez ces derniers avant qu'ils ne fleurissent et produisent des graines. On évacuera alors le bétail de ce pâturage qu'on laissera reposer pour permettre la croissance d'herbe fraîche. Les buissons et les arbres que les caprins aiment brouter produiront aussi des pousses nouvelles.**

**Il peut s'avérer nécessaire de déplacer les troupeaux sur une certaine distance pour trouver de nouveaux pâturages. Les buffles et les bovins peuvent parcourir jusqu'à 3 km et les caprins et les ovins jusqu'à 5 km à partir des points d'eau, en quête de nouveaux pâturages.**

## **Pâturage tournant**

**Pour protéger un pâturage, on peut l'entourer d'un enclos ou d'une haie. Les animaux sont ainsi confinés dans une zone donnée pendant qu'on laisse reposer le pâturage voisin. De cette manière, le terrain peut être utilisé pour le pacage pendant une à deux semaines, après quoi on le laisse reposer pendant plusieurs**

**semaines pour permettre à l'herbe de repousser. C'est ce qu'on appelle un pâturage tournant.**

### Pâturage tournant

Première semaine



Deuxième semaine



Troisième semaine







## Pourquoi pratique-t-on l'aménagement des pâturages?

Le contrôle de l'utilisation des pâturages par le bétail présente plusieurs avantages:

- Le groupement des animaux en troupeaux permet de les surveiller; on remarquera vite tous problèmes tels que la météorisation.
- En empêchant le surpâturage par les animaux, on permettra aux plantes et à leurs racines de maintenir en place le sol superficiel fertile. Ce dernier ne subira pas d'érosion et ne sera pas entraîné dans les cours d'eau et les canaux d'irrigation, ce qui poserait des problèmes aux agriculteurs.
- Le pâturage tournant favorise une nouvelle pousse des plantes fourragères pour les animaux. Il permet à la prairie de reposer assez longtemps pour que les herbages produisent de bonnes racines et graines.

- **Le fait d'entourer certaines zones par des enclos pour empêcher les animaux d'y pénétrer permet la croissance de plantes fourragères particulières, qui pourront ensuite être récoltées et données à manger aux animaux.**
- **Le pâturage tournant permet de combattre les parasites aussi bien internes qu'externes. Ne laissez pas paître en permanence de jeunes animaux près des points d'eau. C'est là que s'accumulent en grand nombre les œufs de parasites.**
- **Le pâturage tournant accroît la fertilité du sol grâce aux déjections des animaux.**

**Encouragez les membres de votre communauté à veiller sur l'environnement local et à le débarrasser d'objets qui pourraient constituer un danger pour les animaux au pacage et pour les gens.**

**N'oubliez pas que le ruminant au pâturage peut manger beaucoup de choses en broutant:**

- **Le fil de fer et les clous peuvent traverser la paroi du rumen, pénétrer dans le cœur et tuer l'animal. Ces objets peuvent aussi blesser les pieds.**
- **Les sacs en plastique peuvent étouffer l'animal et bloquer l'estomac.**
- **Les boîtes de conserve et le verre peuvent couper la bouche, les pieds et les pattes.**

## **Module 25: La peste bovine et la fièvre aphteuse**

***Les ruminants, en particulier les jeunes animaux, peuvent être atteints de diverses maladies.***

***La peste bovine est extrêmement infectieuse et peut tuer les bovins et les buffles.***

***La fièvre aphteuse est très répandue dans de nombreux pays. Elle atteint les bovins, les ovins, les buffles et les caprins.***

***Ces deux maladies sont très importantes. La peste bovine sévit en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, tandis qu'on trouve la fièvre aphteuse dans le monde entier, à l'exception de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Amérique du Nord et désormais de l'Europe occidentale. Demandez à votre service vétérinaire de vous informer davantage sur ces maladies et demandez à votre communauté de prêter son concours à toute campagne de vaccination que le service vétérinaire pourrait organiser.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez pouvoir:**

- 1 Reconnaître quand les bovins et les buffles sont atteints de peste bovine.**
- 2 Reconnaître la fièvre aphteuse chez les ruminants.**

### **La peste bovine**

## **Les signes de la peste bovine chez les bovins et les buffles sont les suivants:**

- **Le premier stade est une forte fièvre (de 40,5 °C à 41,5 °C).**
- **Des taches rouges apparaissent sur le vagin ou le scrotum, suivies de taches sur les lèvres et les naseaux et autour des yeux.**
- **Chez le buffle, le premier signe de la maladie est un écoulement à l'œil.**
- **Du pus (une matière jaunâtre) se développe sur les taches.**
- **La salive devient écumeuse.**
- **L'animal souffre de constipation (il ne parvient pas à déféquer), suivie de diarrhée. Un signe important est la mauvaise odeur de la bouse.**
- **L'animal meurt au bout de quelques jours.**

**La peste bovine est une maladie extrêmement contagieuse; elle peut tuer de nombreux animaux, en particulier les bovins et les buffles. La maladie est surtout propagée par l'eau de boisson qui a été infectée par la bouse d'animaux malades, mais elle peut aussi se propager par contact direct et par l'haleine. La maladie atteint aussi les animaux sauvages et les porcins. La mort de sangliers peut être un signe que la peste bovine est présente dans la région.**

***Demandez à votre vétérinaire de mieux vous informer sur la maladie. Aidez le service vétérinaire s'il mène campagne contre la peste bovine. Vaccinez vos bestiaux contre la peste bovine et marquez-les à l'oreille afin de pouvoir les***

***identifier.*****La fièvre aphteuse**

**Les signes de la fièvre aphteuse sont les suivants:**

- **Le premier stade est une forte température.**
- **De petites ampoules (cloques de la peau remplies de sérosités) appelées aphtes font leur apparition dans la bouche et sur la langue, entre les onglons, autour du sabot et sur les trayons.**
- **L'aphte éclate et la peau qui était dessus disparaît en laissant des taches rougeâtres.**
- **L'animal salive mais il éprouve de la difficulté à manger.**
- **L'onglon peut se détacher et l'animal boitera.**

**Il existe quelques maladies dont les signes sont analogues à ceux de la fièvre aphteuse. Demandez à votre vétérinaire de vous conseiller sur les signes de la maladie.**



## Chapitre 4: Le porc

---

[Module 26: Manipulation et contention des porcs](#)

[Module 27: Le rognage des dents chez les jeunes porcs](#)

[Module 28: Les parasites internes des porcs](#)

[Module 29: Les infections cutanées des porcs](#)

[Module 30: Le rut \(œstrus\) chez la truie](#)

[Module 31: Gravidité et mise bas](#)

[Module 32: Soins à donner à la truie et au porcelet](#)

[Module 33: La castration des porcelets](#)

[Module 34: L'alimentation des porcs](#)

[Module 35: Le logement des porcs](#)

[Module 36: Marquage ou encoche à l'oreille \(identification\)](#)

---

### Module 26: Manipulation et contention des porcs

*Quand les jeunes porcs atteignent l'âge du sevrage, ils sont trop gros pour être facilement soulevés. On peut les déplacer d'un endroit à l'autre en utilisant des planches.*

*Les porcs sont très malins et apprennent vite. Ils peuvent être dangereux.*

### Objectifs d'apprentissage


**Après avoir étudié ce module, vous devez être capable de:**

- 1 Manipuler en toute sécurité les jeunes porcs.**
- 2 Manipuler les porcs plus âgés.**
- 3 Assurer la contention du porc.**

## Manipulation du jeune porc

On peut attraper et tenir les porcelets en les attrapant par la patte arrière juste au-dessus du jarret. On pourra ensuite soulever le porcelet en plaçant l'autre main sous la poitrine. Quand vous tenez le porcelet, appuyez-le toujours contre vous. Quand il aura atteint l'âge du sevrage, le jeune porc sera trop lourd pour qu'on puisse le soulever.

## Manipulation du jeune porc



## Manipulation du porc plus âgé

Les porcs se dirigent naturellement vers une ouverture quand vous approchez d'eux ou quand vous essayez de les attraper. Vous pouvez exploiter cette habitude en vue d'orienter le porc dans la direction que vous souhaitez. Si vous placez deux planches en bois de 80 cm de côté de part et d'autre de la tête du porc, il avancera dans la direction que vous voulez qu'il prenne. A mesure que l'animal vieillit, vous pouvez lui apprendre à se déplacer en obéissant à quelqu'un qui utilise une planche et un battoir en bois d'environ 1 m de longueur.

*Il faut toujours tenir la planche entre soi-même et le porc. Si plusieurs personnes essaient de pousser un porc dans une direction donnée, il se retournera et les chargera.*

## La contention du porc

Vous pouvez retenir un porc en le maintenant avec des cordes contre un mur ou un enclos. La contention des porcs de grande taille peut être réalisée facilement en plaçant une corde ou un anneau en fil de fer autour du groin.

## [La contention du porc](#)

## Module 27: Le rognage des dents chez les jeunes porcs

***Les dents du jeune porc doivent être rognées le plus tôt possible après la naissance. Le porc naît avec huit dents.***

***Si les dents ne sont pas taillées, les porcelets risquent de blesser le pis de la***



***truie en tétant. En outre, la suppression des dents empêche les jeunes porcs de se blesser entre eux quand ils se battent ou jouent.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Pourquoi il faut rogner les dents des jeunes porcs.**
- 2 Quand pratiquer le rognage des dents sur le porcelet et comment le faire.**
- 3 Comment manipuler la truie et ses petits en leur causant le moins de stress possible.**

## **Pourquoi faut-il rogner les dents des porcelets?**

**Les porcelets mordent la truie (leur mère) en se battant pour s'emparer de l'un des trayons et téter. La douleur ainsi provoquée gêne la truie et elle se lève, ce qui empêche les porcelets de téter. De plus, les lésions permettent aux germes d'infecter le pis de la truie. Enfin, en se battant pour s'emparer d'un trayon et téter, les porcelets se mordront les uns les autres et se blesseront. Ces problèmes seront évités si on procède simplement au rognage des dents.**

## **Quand faut-il rogner les dents?**

**Les dents du porcelet doivent être coupées le plus tôt possible après la naissance, même 15 minutes après la naissance. Il faut séparer la truie et ses petits pendant un laps de temps le plus court possible. Pour rogner les dents, il vous faudra des**


## **tenailles (coupe-dents).**

**Quelqu'un devra vous aider à séparer la truie de ses petits. Vous aurez aussi besoin d'une caisse contenant de la litière et d'un enclos vide et propre.**

### **Rognage des dents**

- **Si la truie n'est pas attachée, séparez-la de ses petits et placez-la dans un autre enclos. Prenez vos précautions car une truie avec sa portée peut être dangereuse.**
- **Bloquez les porcelets dans un coin et gardez-les ensemble, ou placez-les dans une caisse.**
- **Tenez la tête et pressez le coin de la bouche du porcelet pour qu'il ouvre les mâchoires.**
- **Placez les tenailles de part et d'autre d'une paire de dents en veillant bien à éviter la langue. Basculez la tête pour que les morceaux de dent sortent de la bouche.**
- **Coupez les dents le plus près possible des gencives.**
- **Nettoyez les tenailles avant de les utiliser sur un autre porcelet. Pratiquez ce rognage sur le reste de la portée et, quand vous avez terminé, rendez les porcelets immédiatement à leur mère. Maintenez-les bien au chaud.**

## Rognage des dents



### Module 28: Les parasites internes des porcs

***Les porcs peuvent être infectés par plusieurs ascarides différents. Le gain de poids diminue alors chez les adultes. Chez les jeunes porcs, l'infection due aux ascarides peut causer la diarrhée, une perte de poids, des problèmes pulmonaires et la mort.***

***Les vers provenant des porcs peuvent provoquer la maladie chez les êtres humains.***

### Objectifs d'apprentissage

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quels sont les problèmes causés par les ascarides chez les porcs.**
- 2 Comment traiter et combattre les infections du porc dues aux ascarides.**
- 3 Quels sont les problèmes causés chez l'homme par les parasites du porc.**

## **L'ascaridiose du porc**

**Les porcs peuvent être infectés par plusieurs types d'ascarides différents. Les éleveurs de porcs peuvent remarquer la présence de grands ascarides, de 25 à 40 cm de long, dans les excréments des animaux. Chez les porcs âgés de 2 à 5 mois, ces vers causent la diarrhée, une perte de poids et des problèmes pulmonaires. Le jeune ver vit dans le foie et les poumons avant de passer dans l'intestin. Les lésions aux poumons peuvent permettre aux germes de pénétrer et de provoquer la toux et des infections pulmonaires. Le jeune porc risque d'en mourir.**

**Le ver dans le foie des porcs jeunes ou adultes provoque l'apparition de taches blanches. L'homme ne doit pas se nourrir du foie ainsi taché.**

## **Traitement et élimination des ascarides**

**On peut soigner facilement les porcs infectés en leur administrant une dose de pipérazine par exemple (voir R13, annexe 1). La truie gravide doit être soignée avant de mettre bas, faute de quoi elle transmettra l'infection à sa portée. Un ver femelle produit chaque jour 1 million d'œufs qui sont éliminés dans les excréments. Ces œufs infectent de nouveaux hôtes et peuvent persister jusqu'à cinq ans dans le sol ou la porcherie.**

**Il faut nettoyer à fond la porcherie, l'abri ou l'enclos et traiter le sol et les parois à**

**la soude caustique qu'on laissera sur place pendant deux à trois jours avant de l'éliminer par un lavage à grande eau. Si des porcs infectés ont été élevés dans un champ, il faut le labourer et s'en servir pour la culture, ou y faire paître d'autres animaux avant d'y remettre des porcs.**

### **Problèmes causés chez l'homme par les parasites du porc**

**Les porcs peuvent être infectés par un ver parasite appelé Trichinella. Le ver adulte vit dans l'intestin, tandis que les jeunes vers se trouvent dans les muscles (la viande). Il semble que cela ne pose pas de problème au porc. Tout animal qui mange de la viande de porc peut être infecté par le ver.**

**Les porcs peuvent être infectés par Trichinella quand ils dévorent des rats qui ont été eux-mêmes infectés. Les porcs sont également infectés par la viande contaminée; c'est pourquoi il faut bien faire cuire toute la viande donnée aux animaux (par exemple dans les eaux grasses). En faisant bien cuire la viande de porc, on peut aussi tuer le ver. Si l'homme mange de la viande de porc insuffisamment cuite provenant d'un animal infecté par ce parasite, il sera lui-même infecté.**

**Si on laisse un porc divaguer, il risque de manger des plantes contaminées par des excréta humains. La viande du porc sera ainsi infectée par un ténia provenant d'un être humain. Si la viande de ce porc n'est pas suffisamment cuite, les personnes qui la mangeront risquent d'être infectées par le ténia du porc.**

***Ne laissez pas les porcs divaguer librement.***

### **Module 29: Les infections cutanées des porcs**

***Les porcs peuvent être infectés par les poux et les acariens de la gale. La gale peut provoquer des lésions qui s'infecteront, de sorte que la peau ne sera plus utilisable pour la production de cuir. L'homme peut aussi être infecté par la gale.***

***Le porc peut également être attaqué par des tiques.***

***Les porcs peuvent être atteints d'érysipèle (rouget du porc), qui provoque sur la peau des rougeurs en forme de losanges.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Reconnaître la gale et les infections des porcs dues aux poux.**
- 2 Combattre et soigner chez le porc la gale et les infections dues aux poux.**
- 3 Reconnaître les signes du rouget du porc.**
- 4 Combattre et traiter les infections des porcs dues aux tiques.**

## **La gale chez les porcs**

**La gale est causée par une infection provoquée par des acariens (voir module 16); elle provoque un épaissement de la peau avec formation de croûtes. L'activité des acariens qui creusent des galeries dans la peau incite le porc à se gratter, et les blessures ainsi causées peuvent s'infecter. La gale se manifeste autour de la tête, des oreilles, des pattes et de la queue, mais elle peut s'étendre à tout le corps si elle n'est pas traitée.**

**On combat la gale par des pulvérisations, des bains de déparasitage ou le badigeonnage d'une préparation appropriée sur les régions infectées (voir R15, annexe 1). Il faut aussi nettoyer à fond et bien laver l'enclos et l'abri. Le traitement devra être renouvelé au bout de deux semaines.**

**Après avoir travaillé avec des porcs atteints de la gale, lavez-vous bien les mains et lavez aussi vos habits.**

**Si la gale pose dans votre communauté un problème auquel vous ne pouvez pas remédier, vous devrez demander conseil au service vétérinaire. Pour identifier l'acarien qui cause le problème, le vétérinaire devra faire prélever des morceaux de peau sur les animaux infectés. L'identification de l'acarien lui permettra de décider du traitement à appliquer.**

### **Infections dues aux poux et aux tiques**

**Les porcs peuvent souffrir d'infections dues à des poux de couleur foncée qu'on peut voir sur le corps de l'animal. Les poux se nourrissent sur la peau et irritent le porc qui se gratte, provoquant ainsi des lésions qui s'infecteront. Le traitement comporte des pulvérisations au coumaphos (voir R15, annexe 1) et le nettoyage de la porcherie.**

**Les porcs peuvent être attaqués par certaines tiques qui prélèvent le sang. Ces tiques peuvent transmettre d'autres infections aux animaux. On procédera au traitement en pulvérisant un composé approprié (voir R15, annexe 1), ou en retirant les tiques à la main, ou encore en les touchant avec du pétrole ou une cigarette allumée. Les enclos atteints doivent être nettoyés à fond.**

## Le rouget du porc

**Le rouget du porc ou érysipèle peut tuer les animaux. C'est une infection du corps du porc qui produit des rougeurs facilement reconnaissables. Ces rougeurs en forme de losange sur la peau de l'animal peuvent prendre une coloration pourpre sur la tête et les oreilles. Les porcs atteints de rouget ont une forte température et ne mangent pas; ils poussent des cris si on les touche. L'animal peut mourir d'une infection aiguë; dans les cas chroniques, l'animal survit, mais il souffre d'une tuméfaction des articulations et de boiterie.**

**On traite le rouget du porc à la pénicilline, un antibiotique (voir R7, annexe 1). Les animaux peuvent être vaccinés contre le rouget du porc.**

### Module 30: Le rut (œstrus) chez la truie

***La femelle du porc (la truie) est prête à se reproduire (c'est-à-dire qu'elle parvient à la puberté) à l'âge de 5 mois; elle accuse alors des signes de rut. Certains types à croissance plus lente, ainsi que les animaux sous-alimentés, n'atteindront la puberté qu'à un âge plus tardif.***

***La truie sera en chaleur toutes les trois semaines pendant toute l'année si elle n'a pas été saillie.***

### Objectifs d'apprentissage

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

#### **1 Quand une truie est prête pour l'accouplement.**



**2 A quels intervalles la truie est en chaleur.**

**3 Quels sont les signes de chaleurs chez la truie.**

**4 Comment provoquer le rut chez la truie.**

**Quand la truie est-elle prête pour la saillie?**

**Les porcs de la plupart des races atteignent la puberté à l'âge de 5 mois, mais certains, par exemple le porc chinois, sont en rut pour la première fois à l'âge de 3 mois s'ils reçoivent assez de bonne nourriture et d'eau.**


**La truie ne doit pas être utilisée pour la reproduction quand elle est en rut pour la première fois. Il est plus sage de la laisser grandir pendant encore un mois avant de la faire saillir. Elle sera alors mieux capable de porter et d'allaiter une cochonnée suffisante. Seules doivent être utilisées pour la reproduction les truies à 14 trayons, afin que tous leurs petits puissent se nourrir.**

**Si la truie n'est pas saillie, elle sera en chaleur tous les 21 jours, à condition de recevoir assez de nourriture et d'eau.**

**Les signes du rut**

**La truie qui approche du rut est agitée et parfois elle ne se nourrit pas. La vulve devient rose et tuméfiée. Si on presse fort avec les mains de chaque côté de son dos, elle se tient immobile, montrant qu'elle est prête à accepter le mâle.**

**Les signes du rut**



**La truie reste en chaleur pendant 8 à 36 heures.**

**Comment provoquer le rut chez la truie**

**Il est possible de provoquer le rut chez les truies saines et bien nourries, afin de pouvoir contrôler la reproduction.**

**Si on place une truie en chaleur parmi d'autres qui ne le sont pas, quelques-unes de celles-ci approcheront du rut. Une meilleure méthode consiste à mettre les truies dans un enclos à proximité d'un verrat afin qu'elles puissent le voir et le sentir. Les truies seront alors en chaleur, surtout si le verrat est âgé et dégage une forte odeur.**

***N'oubliez pas que si la truie n'est pas en chaleur, cela est peut-être dû à une alimentation médiocre ou insuffisante, ou bien à la maladie.***

## **Module 31: Gravidité et mise bas**

***La gestation dure trois mois, trois semaines et trois jours.***

***Une truie bien nourrie produira au moins 10 porcelets (cochonnée ou portée) à chaque gestation et elle peut avoir deux portées par an.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez être capable de:**

- 1 Vous occuper de la truie gravide.**
- 2 Déceler quand la truie est sur le point de mettre bas.**
- 3 Reconnaître une mise bas normale.**
- 4 Déceler quand la truie a des problèmes et de l'aider.**

### **Comment s'occuper de la truie gravide**

**Si la truie n'accuse aucun signe de rut trois semaines après la saillie, elle est gravide. La gestation durera environ trois mois, trois semaines et trois jours. Pendant la gestation, la truie aura besoin d'une alimentation abondante, riche en nutriments; il lui faudra en particulier davantage de nourriture vers la fin de la gestation. Elle devra recevoir tous les jours des aliments riches en nutriments, comme les céréales et le fourrage vert. En laissant la truie accéder à un sol ou à des herbages enracinés propres sur un terrain où l'on n'a pas élevé de porcs, on lui permettra d'absorber les minéraux dont elle a besoin.**

**Quand la mise bas est proche, donnez à la truie une abondante litière propre.**

## **Les signes d'une mise bas proche**

**La truie devient agitée et commence à confectionner un nid dans les 24 heures qui précèdent la mise bas. Le trayon produira du lait si on le pince doucement.**

**Un liquide sanguinolent s'écoule du vagin 1 à 2 heures avant le début de la mise bas, et si des boulettes verdâtres font leur apparition, le premier porcelet sortira dans l'heure.**

***Si on lui frotte doucement la mamelle, la truie se détendra et s'allongera sur le côté en position pour mettre bas.***

## **Mise bas normale**

**La mise bas est un processus naturel; habituellement, la truie n'aura besoin d'aucune aide. Une fois né le premier porcelet, les autres, de même que le placenta, suivront rapidement. La mise bas devra être achevée au bout de 2 à 3 heures. Le cordon ombilical se rompra (vous n'avez pas besoin de le couper), et le porcelet recherchera immédiatement un trayon et du lait. Si le nombril saigne, serrez-le fortement avec une ficelle ou une corde propre.**

## **Quand et comment aider à la mise bas**

**Si la truie accuse tous les signes de mise bas mais n'a pas produit de porcelet et donne des coups en l'air avec une patte arrière, ou si 45 minutes se sont écoulées depuis l'apparition du premier porcelet sans qu'il y ait le moindre signe du deuxième, il vous faudra aider la truie.**

- **Lavez-vous les mains et les bras à l'eau chaude et au savon, et brossez bien sous les ongles.**
- **Lavez la région de la vulve.**
- **Savonnez-vous les mains ou enduisez-les d'huile d'olive ou de tournesol.**
- **Introduisez la main dans le vagin pour rechercher le porcelet ou la matière qui provoque le blocage et essayez de l'enlever.**

**Dégagez les mucosités sur la bouche et le groin du porcelet; s'il ne respire pas, vous pouvez le gifler pour l'encourager à respirer. Frictionnez doucement le porcelet pour le sécher et placez-lui la bouche sur un trayon.**

### **Module 32: Soins à donner à la truie et au porcelet**

***Une truie saine et bien nourrie sera capable d'élever au moins 20 porcelets chaque année.***

***Si la truie doit nourrir trop de porcelets, ou bien si elle meurt, les petits peuvent être mis en nourrice ou allaités à la main.***

#### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Si la truie est une bonne mère.**

**2 Si les porcelets se nourrissent de façon satisfaisante.**

**3 Comment mettre les porcelets en nourrice.**

**4 Comment allaiter les porcelets à la main.**

**La truie est-elle une bonne mère?**

**Une truie doit avoir au moins 14 trayons; ceux-ci doivent être assez longs et minces pour que les porcelets puissent les saisir. Chaque porcelet tète son propre trayon et s'y nourrit toutes les heures. Les premiers-nés et les porcelets plus vigoureux tètent les trayons les plus proches de la tête de la truie, qui produisent le plus de lait. A mesure qu'une truie vieillit et a davantage de cochonnées, les trayons deviennent plus gros et les porcelets éprouvent alors des difficultés à téter. Parfois, les trayons situés vers l'arrière ne produisent pas beaucoup de lait. Une truie peut être incapable de nourrir tous ses petits et elle n'est plus bonne pour la reproduction.**

**Une truie peut être atteinte de mammite, cette maladie se développant par suite d'une lésion des trayons causée par les dents des porcelets. En taillant les dents du porcelet (voir module 27), on évite que les trayons ne soient coupés.**

**Les petits se nourrissent-ils bien?**

**Les porcelets ne pousseront pas tous aussi vite, et certains seront nés plus petits que les autres. Ils se battent pour se nourrir, et les plus petits porcelets grandiront plus lentement; ils risquent même de mourir. Dans toute portée, vous pouvez vous attendre à constater une différence entre les petits en ce qui concerne le gain de poids et la croissance, mais si tous les porcelets ne grandissent pas bien et si**

**vous ne décelez aucun signe patent de maladie, vous devez présumer que la mère ne produit pas assez de lait. C'est souvent le cas chez les truies âgées.**

**Il peut s'avérer nécessaire de mettre les porcelets en nourrice, c'est-à-dire de les faire téter une autre truie.**

### **Mise en nourrice des porcelets**

**Il est indispensable que tous les porcelets prélèvent le colostrum de leur mère. Ils prendront leur première tétée dans l'heure qui suit la naissance.**

**Si une truie meurt pendant la mise bas, la cochonnée peut être placée chez une truie nourricière. Il faut mêler les orphelins aux propres petits de la truie afin qu'elle les accepte. Cependant, la truie nourricière ne sera pas capable d'allaiter simultanément les deux portées; il sera nécessaire d'utiliser plusieurs truies nourricières pour alimenter les orphelins.**

### **Allaitement des porcelets au biberon**

**Il se peut qu'une truie meure et qu'on ne dispose d'aucune truie nourricière. La cochonnée peut alors être allaitée au biberon. A cette fin, il faudra:**

- **Disposer de biberons et de tétines parfaitement nettoyés avant chaque tétée.**
- **Placer, dans un endroit chaud, une caisse sèche et propre contenant de la litière propre pour les porcelets nouveau-nés.**

- **Allaiter les porcelets à des intervalles réguliers de 1 à 2 heures.**

**Le meilleur substitut du colostrum de la truie est le colostrum de la vache; après trois à quatre jours, les porcelets pourront recevoir du lait.**

### **Module 33: La castration des porcelets**

***La castration, c'est-à-dire l'ablation des testicules, est pratiquée sur le porc mâle qui n'est pas destiné à la reproduction.***

***Si on coupe franchement le vaisseau sanguin conduisant aux testicules ou si on tire dessus, il risque de saigner abondamment. Le saignement sera réduit si on gratte le vaisseau sanguin entortillé avec un couteau jusqu'à ce qu'il soit coupé.***

***Les animaux châtrés sont plus dociles et plus faciles à manipuler.***

***L'animal châtré est plus gras et produit une viande qui ne dégage pas une forte odeur.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Pourquoi les porcs mâles sont châtrés.**
- 2 Quand la castration est pratiquée.**
- 3 Comment assurer la contention des porcs pour la castration.**
- 4 Comment châtrer les animaux.**



## **Pourquoi pratique-t-on la castration sur les porcs?**


**Les porcs mâles (verrats) peuvent se battre et se blesser les uns les autres. Les porcs châtrés sont plus tranquilles et plus faciles à manipuler. Le porc châtré engraisse davantage, et la viande ne dégage plus une forte odeur porcine. Les jeunes porcs doivent être châtrés à l'âge de deux ou trois semaines.**

### **Contention du porc pour la castration**

**Il vous faudra quelqu'un pour tenir le porcelet en vue de la castration. Le porc doit être saisi par les pattes arrière avec la tête en bas, et son corps doit être maintenu fermement entre les genoux de l'assistant.**

### **Contention du porc pour la castration**

Coupures de castration



## La castration du porc

**Vous aurez besoin d'un couteau propre très aiguisé, d'un scalpel ou d'une lame de rasoir. Séparez la truie de sa portée et, si possible, placez-la dans un endroit où elle ne pourra ni voir ni entendre les porcelets.**

- **Lavez le scrotum (la bourse) à l'eau chaude et au savon, puis séchez-le.**

• **Faites descendre le testicule dans le scrotum avec votre doigt, puis**

- **Faites descendre le testicule dans le scrotum avec votre doigt, puis saisissez fermement le scrotum sous le testicule entre le pouce et l'index.**
- **Pratiquez une coupure de 1 à 2 cm de long sur le fond du scrotum. Le testicule doit sortir par l'ouverture.**
- **Tirez le testicule en dehors du scrotum et coupez à travers le cordon blanc *en épargnant le vaisseau sanguin rouge.***
- **Tirez le testicule encore plus en dehors et faites-le tourner plusieurs fois *avant de couper le vaisseau sanguin entortillé en le grattant de haut en bas avec le couteau, ce qui contribue à réduire le saignement. Ne tirez pas pour briser le vaisseau sanguin.***
- **N'introduisez pas les doigts dans le scrotum. Appliquez sur la blessure de castration de la teinture d'iode, du violet de gentiane, une poudre antibiotique (voir R5, annexe 1) ou une poudre aux sulfamides. Retirez le second testicule en procédant de la même façon.**

**Placez les porcelets et leur mère sur une litière propre. Surveillez les porcelets pour déceler les signes d'infection dans la blessure pendant la semaine qui suit. Les lésions de castration infectées sont tuméfiées, et les porcelets se refusent à marcher ou boitent (voir module 73 pour le traitement).**

### **Module 34: L'alimentation des porcs**

***Le porc est omnivore et peut manger de la viande et des plantes. L'appareil digestif du porc peut aussi utiliser des aliments grossiers contenant beaucoup de***

***lest.***

***Les porcs doivent disposer tous les jours de beaucoup d'eau fraîche bien propre.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quels types de nourriture il faut donner aux porcs.**
- 2 A quels intervalles vous devez nourrir les porcs.**
- 3 Comment et quand sevrer les porcelets.**

## **Les types de nourriture à donner aux porcs**


**Les porcs mangent de tout. Ils mangeront l'herbe et tous les types de végétaux. On peut les garder dans un champ bien clôturé où ils mangeront toutes les plantes et toute l'herbe qui s'y trouvent. Non seulement le porc mange les parties vertes des plantes, mais de plus il creuse dans le sol et dévore toutes les racines. Quand il a un anneau dans le groin, un porc ne peut plus déraciner les plantes.**

**L'homme peut exploiter les habitudes alimentaires du porc. Si on place un porc dans un champ, il le défrichera, le labourera et le fertilisera.**

**Les porcs grandiront et engraisseront plus vite s'ils sont nourris d'aliments concentrés. Les céréales bien broyées en farine sont une bonne nourriture. On peut aussi donner aux porcs les déchets de légumes et les restes du ménage. Avant de donner ces restes aux porcs, surtout ceux qui contiennent de la viande, il faut bien les faire bouillir (eaux grasses).**

**Le porc doit toujours pouvoir boire de l'eau fraîche bien propre. Une truie qui a une portée aura besoin de 20 à 30 litres d'eau par jour.**

### **Les types de nourriture à donner aux porcs**



**A quels intervalles faut-il nourrir un porc?**

**Les porcs peuvent être élevés dans une porcherie où il faudra les nourrir deux fois par jour, le matin et le soir. Les porcs en liberté dans un champ peuvent recevoir de la farine une fois par jour ou, si l'on en dispose, un supplément de nourriture comme des déchets de légumes ou des eaux grasses.**

### **Sevrage**

**Les porcelets s'intéressent aux aliments solides quand ils sont âgés de 1 à 2 semaines. On peut commencer par leur offrir une poignée de céréales, de sucre ou de lait en poudre. Les porcelets téteront la mère jusqu'à l'âge d'environ 7**

**semaines. Ils prendront progressivement moins de lait et mangeront davantage d'aliments solides jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Les porcelets en liberté dans un champ commenceront naturellement à manger des aliments solides, mais s'ils sont dans un enclos il faut leur en offrir.**

**Les jeunes animaux doivent recevoir les nouveaux aliments progressivement pour éviter les problèmes de digestion.**

***N'oubliez pas qu'un porc doit se précipiter sur la nourriture. S'il ne s'intéresse pas à la nourriture, c'est un signe de mauvaise santé; vous devrez inspecter l'animal pour déterminer la cause du problème.***

### **Module 35: Le logement des porcs**

***Les porcs peuvent être élevés dans un champ comportant un abri ou dans une porcherie.***

***Il ne faut pas laisser les porcs divaguer librement. On ne pourra exercer dès lors aucun contrôle sur ce qu'ils mangent, on ne saura pas où ils vont et la maladie se propagera.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**


- 1 Comment garder des porcs dans un champ.**
- 2 Quels sont les types de logements (bâtiments et enclos) pour les porcs.**
- 3 Comment héberger les porcelets.**

## Elevage des porcs dans un champ

Les sangliers vivent parmi les buissons et les racines des arbres. Quand les porcs d'élevage ont accès à un endroit creux et chaud pour s'y coucher et dormir, comme ce serait le cas dans la nature, ils se portent mieux.

Les porcs peuvent être élevés dans un champ où ils se nourrissent d'herbe et de plantes. Si on procède ainsi, il faut entourer le champ d'une clôture solide ou d'un mur. Si la clôture n'est pas assez solide, les porcs la pousseront et sortiront du champ. On aménage pour les animaux des abris appelés piglous où ils peuvent dormir. Ces abris sont en bois ou en tôle et doivent contenir une litière. Ils peuvent être déplacés au besoin.

### Elevage des porcs dans un champ



## Loges ou cases et enclos pour porcs


**Les porcs peuvent être élevés isolément ou en petits groupes dans une porcherie, ou dans un enclos à sol en béton ou autre matériau solide, comportant un abri à plafond bas.**

**Pour construire une porcherie, choisissez une zone qui n'est jamais inondée pendant la saison des pluies. Elle ne doit pas être trop proche des habitations, afin que les gens ne soient pas gênés par les odeurs et les mouches. Le sol doit être en béton et en pente à partir du gisoir ou aire de couchage afin que l'urine s'écoule en s'éloignant. Le sol de béton doit reposer sur des assises solides et doit avoir de 5 à 6 cm d'épaisseur. Si le béton est trop mince et se fissure, les porcs ne tarderont pas à le soulever. Un sol en terre battue ne peut pas être maintenu propre, et il y aura des problèmes avec les parasites et d'autres maladies. Les parois de la porcherie doivent être relativement lisses afin qu'on puisse les maintenir propres. Des fissures dans les murs permettraient aux saletés et aux germes de s'accumuler.**

**Les animaux ont besoin d'une litière abondante dans l'abri. Les porcs défèquent toujours à l'écart du gisoir et de l'endroit où ils se nourrissent. Les excréments peuvent être évacués tous les jours pour tenir l'enclos bien propre et éviter l'accumulation de déchets et d'odeurs.**

**Loges ou cases et enclos pour porcs**






## **Le logement des porcelets**

**Les truies de reproduction et leurs cochonnées peuvent être élevées dans des porcheries ou en plein air. Il faut leur donner une litière abondante, afin de tenir les jeunes animaux au chaud, et on doit la renouveler fréquemment. Si une portée est élevée dans une porcherie, celle-ci doit être parfaitement nettoyée après que les porcelets ont été sevrés et transférés ailleurs. Si la portée est élevée en plein air, l'abri sera transféré à un autre endroit pour la portée suivante, afin d'éviter que ne surgissent des problèmes de maladies, dus en particulier aux vers parasites.**

**Quel que soit le système utilisé pour le logement, les porcelets doivent avoir accès à un endroit chaud que la truie ne peut pas atteindre. C'est là qu'on donnera la**

**nourriture aux porcelets et ils pourront s'y coucher sans que la mère risque de s'allonger sur eux. On empêche la truie d'y pénétrer en plaçant au travers d'une partie de l'abri une cloison temporaire faite de planches ou de barreaux solides. Le barreau inférieur doit être à environ 30 cm du sol, ce qui permet aux petits porcelets de passer en dessous.**

### Le logement des porcelets



***Ne laissez pas les porcs divaguer librement dans la communauté. Cela provoque la propagation des maladies parmi les animaux et aussi leur transmission de l'animal à l'homme.***

### **Module 36: Marquage ou encoche à l'oreille (identification)**

***Le bouton d'oreille ou l'encoche vous permet d'identifier vos porcs. L'encoche est facile à pratiquer et ne coûte rien. Vous pouvez identifier de cette manière jusqu'à 121 porcs.***

***Cette méthode peut être utilisée pour identifier d'autres animaux, par exemple les ovins et les caprins.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Pourquoi nous identifions les animaux.**
- 2 Comment pratiquer une encoche à l'oreille.**
- 3 Comment relever le numéro d'un porc.**

## **Pourquoi nous avons besoin d'identifier les animaux**

**Si vous n'avez que quelques porcs ou autres animaux, leur identification ne pose pas de problème. Vous pourrez les identifier à vue et il est fort possible que vous ayez donné un nom à chacun. Vous aurez besoin d'un moyen d'identification si vous élevez un grand nombre d'animaux, surtout si vous tenez des registres (voir annexe 5). Il existe de nombreuses façons d'identifier les animaux, notamment les colliers numérotés, le tatouage et les étiquettes en plastique. Il est facile de pratiquer une encoche à l'oreille et c'est le moyen d'identification le moins cher.**


## **L'encoche à l'oreille**

**Avec une pince emporte-pièce propre, on peut pratiquer une encoche en V au bord**

de l'oreille. L'encoche doit avoir quelques centimètres de profondeur afin qu'à l'avenir vous puissiez la voir de loin.

Les encoches sur l'oreille gauche sont pour les nombres à un chiffre et celles de l'oreille droite sont pour les dizaines.

### L'encoche à l'oreille




**Relevé du numéro du porc**

Regardez les encoches sur les oreilles droite et gauche, puis additionnez-les sur chaque oreille pour obtenir le numéro de l'animal.


**Relevé du numéro du porc**




Numéro 8



Numéro 15



Numéro 104



Numéro 50



---

## Chapitre 5: Chevaux, ânes et mulets

---

### [Module 37: Comment maîtriser les chevaux, les ânes et les mulets](#)

[Module 38: Comment déterminer l'âge des chevaux](#)

[Module 39: Soins des sabots \(pieds\), ferrure et boiterie](#)

[Module 40: La colique](#)

[Module 41: Les parasites internes des équidés](#)

[Module 42: Les affections de la peau et du pelage des équidés](#)

[Module 43: Rut \(œstrus\), accouplement et gestation](#)

[Module 44: Poulinage et soins aux jeunes animaux](#)

[Module 45: Ecurie et pâturage](#)

[Module 46: Le fourrage et l'eau pour les équidés](#)

[Module 47: Pansage et harnais](#)

[Module 48: La peste équine](#)

---

## Module 37: Comment maîtriser les chevaux, les ânes et les mulets

***Les chevaux, les ânes et les mulets sont appelés équidés.***

***Les équidés peuvent donner des coups de pied et mordre. Il existe différentes manières de maîtriser ces animaux pour les examiner, les soigner ou les ferrer.***

### Objectifs d'apprentissage

Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:

- 1 Ce que sont les équidés.**
- 2 Comment utiliser un tord-nez.**
- 3 Comment maîtriser les équidés.**
- 4 Comment entraver les équidés.**

## **Les équidés**

**On appelle équidés les membres de la famille du cheval; ils sont solipèdes. Les équidés sont le cheval, l'âne, le mulet et le bardot. Le bardot est engendré par un cheval et une ânesse.**

### **Utilisation du tord-nez**

**Le tord-nez est un outil simple qu'on utilise pour maîtriser les équidés. Vous pouvez confectionner un tord-nez avec un bâton épais et solide percé à une extrémité d'un trou où passe une boucle de corde de 30 cm de longueur. On glisse le tord-nez autour de la lèvre supérieure de l'animal.**


**Passez la main à travers la boucle et saisissez la lèvre supérieure de l'animal. Faites glisser la corde au-dessus de la main et tordez le bâton pour serrer la corde autour de la lèvre supérieure.**

**Ne placez pas le tord-nez sur l'oreille de l'animal car c'est très douloureux.**

### **Utilisation du tord-nez**



Tord-nez



## Comment entraver les animaux

Les entraves consistent en quatre sangles dont chacune est munie d'un bracelet métallique. Une corde est passée à travers les bracelets. En tirant sur la corde, on fait tomber l'animal et, quand il est au sol, il faut bien lui tenir la tête pour qu'il ne se relève pas. Les animaux sont entravés pour qu'on puisse les examiner ou pratiquer la castration.

Chez la jument, on entrave uniquement les jambes postérieures quand elle est accouplée à un étalon de valeur. Les entraves l'empêchent de blesser l'étalon


## [Comment entraver les animaux](#)

## Comment empêcher l'animal de bouger ou de donner des coups de pied



**En relevant une jambe de l'animal, on l'empêchera de bouger ou de ruer en donnant des coups de pied. Il sera ainsi plus facile de l'examiner, de vérifier ses dents ou de prendre sa température. Il sera nécessaire de retenir la tête de l'animal. Il faudra peut-être utiliser le tord-nez pour assurer une contention parfaite.**

### **Maintien de la jambe antérieure pendant la prise de température**



**Comment couvrir la tête de l'animal (bandeau sur les yeux)**


**En bandant les yeux de l'animal avec une couverture, une veste ou un sac, on le**

**calmera et il sera plus facile de le maîtriser.**

### **Comment ouvrir la bouche de l'animal**

**Saisissez une oreille et glissez l'autre main entre les incisives et les molaires, puis tirez la langue de l'animal en dehors de sa bouche. La langue du cheval est longue, contrairement à celle de la vache. Il est utile d'ouvrir la bouche de l'animal pour vérifier les molaires en vue de déterminer son âge, ou pour râper les dents ou administrer un breuvage.**

### **Comment ouvrir la bouche de l'animal**



## **Module 38: Comment déterminer l'âge des chevaux**

***On peut déterminer l'âge des chevaux avec une certaine exactitude jusqu'à l'âge de 5 ans en inspectant les incisives et les molaires.***

***Un cheval peut vivre et travailler pendant de nombreuses années si on lui soigne bien les pieds et les dents.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Reconnaître la première dentition (dents de lait) du cheval.**
- 2 Reconnaître la dentition permanente.**
- 3 Reconnaître le sillon de Galvayne.**
- 4 Déterminer l'âge des chevaux.**
- 5 Identifier les problèmes dentaires des chevaux.**

## **La dentition provisoire (première dentition ou dents de lait) du cheval**

**A la naissance, le poulain n'a que deux incisives à chaque mâchoire; d'autres dents provisoires (dents de lait) font leur apparition à mesure que le poulain grandit. Il y a 24 dents provisoires, plus petites que les dents permanentes.**

**Mâchoire supérieure: 6 incisives, 3 molaires de chaque côté.**

**Mâchoire inférieure: 6 incisives, 3 molaires de chaque côté.**

## **La deuxième dentition**

**Quand vous avez besoin de voir les dents de l'animal, vous pouvez ouvrir les lèvres pour regarder les incisives, mais pour voir les molaires vous devez tirer la langue du cheval en dehors de la bouche (voir module 36).**

**Le cheval a de 36 à 40 dents permanentes:**

- **Incisives: 6 dents à chaque mâchoire.**
- **Molaires: 6 dents de chaque côté de la mâchoire.**
- **Canines: dents longues et aiguisées situées dans l'espace entre les molaires et les incisives. Le cheval a 4 canines, 1 de chaque côté de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure.**

**Les canines sortent quand le cheval a 4 ans. Elles sont grandes chez le mâle, mais très petites ou absentes chez la jument.**

**Comment déterminer l'âge des chevaux**

**Les dents à la mâchoire supérieure et à la mâchoire inférieure sont semblables.**

**(1) A la naissance: 2 incisives provisoires.**

**(2) A 1 mois: 4 incisives provisoires, 3 molaires provisoires de chaque côté.**

**(3) De 6 à 9 mois: 6 incisives provisoires.**

**(4) A 1 an: 4 molaires.**


**(5) A 1 an et 6 mois: 5 molaires.**

**(6) A 2 ans et 6 2 incisives permanentes remplacent 2 provisoires.**

- mois:**  
**(7) A 3 ans et 6**      **4 incisives permanentes sont visibles.**  
**mois:**
- (8) A 4 ans:**      **4 canines sont visibles avec 6 molaires.**
- (9) A 4 ans et 6**      **6 incisives permanentes.**  
**mois:**

**Voir le diagramme suivante.**

**Le diagramme**




**De l'âge de 6 ans à l'âge de 25 ans, c'est le point de contact des incisives et l'usure à la surface des dents qui indiquent l'âge de l'animal.**

### **[Comment déterminer l'âge des chevaux](#)**

#### **Le sillon de Galvayne**

**C'est un autre moyen de déterminer l'âge du cheval entre 10 et 30 ans. Le sillon fait son apparition à l'âge de 10 ans, sous la forme d'une petite fente à la partie supérieure des incisives extérieures appelées coins. Dès l'âge de 15 ans, le sillon a atteint le milieu de la dent et à 20 ans il est en bas de la dent. Il commence alors à se combler et à 30 ans le sillon a disparu.**

#### **Le sillon de Galvayne**



## Problèmes dentaires

Comme les équidés broient leur nourriture, le bord des dents s'aiguise et peut endommager la langue ou l'intérieur de la joue. Si vous découvrez qu'un animal éprouve de la difficulté à manger, ouvrez-lui la bouche en tirant sur sa langue (voir module 36) et vérifiez les molaires avec le doigt. Vous aurez peut-être besoin d'un vétérinaire pour râper les dents.

***Vous devez vérifier les dents plusieurs fois par an. N'oubliez pas que chez les équidés il est indispensable que les dents et les sabots soient en bon état.***



## **Module 39: Soins des sabots (pieds), ferrure et boiterie**

***Le pied des équidés est une zone très sensible et doit être examiné fréquemment.***

***Un animal robuste et bien nourri ne sert à rien s'il a un sabot défectueux.***

### **Objectifs d'apprentissage**


**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Comment est structuré le pied d'un équidé.**
- 2 Comment garder le pied de l'animal en bonne santé.**
- 3 Quelle est l'importance de la ferrure des animaux.**
- 4 Comment reconnaître la boiterie chez les équidés.**
- 5 Comment soigner l'animal qui boite.**

### **Le pied des équidés**

**Le pied des équidés se compose de trois os: le paturon, la couronne et le petit-pied (os du sabot). Nous voyons la paroi ou muraille du sabot et, au-dessous, la sole.**

### **Le pied des équidés**



## Comment maintenir le sabot en bonne santé

Il faut habituer l'animal à ce qu'on lui saisisse le pied. Nettoyez la sole du sabot pour retirer la boue et le crottin. Si ces matières ne sont pas éliminées, l'humidité qu'elles contiennent peut provoquer une infection de la sole du sabot.

Vous devez badigeonner régulièrement la muraille du sabot de graisse ou d'huile pour qu'elle reste humide. Cela empêchera le sabot de se fissurer.

## L'importance de la ferrure

La muraille ou paroi du sabot pousse comme l'ongle sur votre doigt. Elle s'use à mesure que le cheval marche. Quand les animaux marchent ou travaillent sur des

**surfaces dures, par exemple les routes bétonnées, goudronnées ou empierrées, le sabot peut s'user plus vite qu'il ne repousse. Dans ce cas, la pose d'un fer à cheval protège le sabot. Si un animal est ferré, les fers doivent être retirés toutes les six semaines, afin qu'on puisse éliminer la partie du sabot qui a trop poussé.**

**En ferrant le sabot et en l'enduisant d'huile, on l'empêche de se fissurer. Contactez le maréchal-ferrant chaque fois que vous désirez faire ferrer les animaux ou si le cheval boite par suite d'un problème avec les sabots.**

## **La boiterie**


**On appelle boiterie une démarche ou allure anormale; elle est provoquée par une lésion ou une maladie.**

**N'oubliez pas qu'il peut être difficile de découvrir où se trouve la boiterie et ce qui la cause. Pour identifier la jambe qui boite, vous devez procéder ainsi:**

- **Passez le harnais et demandez à quelqu'un de conduire le cheval autour de vous.**
- **Pour vérifier les jambes antérieures, demandez à votre aide de faire trotter le cheval vers vous; vous verrez qu'un cheval qui boite relève la tête en trottant. La tête se relève chaque fois que la jambe blessée touche le sol.**
- **Pour vérifier les jambes postérieures, faites trotter l'animal en l'éloignant de vous. Observez bien le dos du cheval et vous le verrez se soulever chaque fois que la jambe blessée frappe le sol.**

- **Examinez la jambe blessée pour déceler toute chaleur, tuméfaction ou douleur.**
- **La boiterie est généralement causée par un problème de sabot.**

### La boiterie



### Comment soigner les animaux qui boitent

**Vous devez consulter le vétérinaire, mais vous pouvez tenter de résoudre vous-même le problème.**

- **Parfois, la boiterie est causée par une infection de la sole du sabot. La sole est douloureuse et il y a formation de pus. Nettoyez la blessure et badigeonnez-la avec de la teinture d'iode. Laissez l'animal se reposer; ne**

## **le faites pas travailler.**

- **Une fissure dans la muraille du sabot peut entraîner la boiterie; on la guérit en huilant le sabot et en le faisant ferrer correctement.**
- **La partie inférieure du pied peut être infectée; elle devient humide et noire, et dégage une mauvaise odeur. On appelle cela la pourriture de la fourchette; on l'observe chez les chevaux qu'on garde sur un terrain détrempé. Éliminez la partie infectée en la découpant et badigeonnez cette partie du pied avec du formol ou de la teinture d'iode (voir R4, annexe 1).**

## **Module 40: La colique**

***On entend par colique des douleurs abdominales; elle peut être continue ou se manifester par intermittence.***

***Il existe de nombreuses causes de colique, dont les vers parasites, un fourrage défectueux ou l'abreuvement trop tôt après le travail.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quand un animal a la colique.**
- 2 Ce qui cause la colique.**
- 3 Comment empêcher la colique.**
- 4 Comment traiter la colique.**

## **Comment reconnaître la colique**

**On désigne par colique les douleurs abdominales qui sont fréquentes chez les équidés. Les signes de colique sont les suivants:**

- **L'animal se donne des coups de pied dans le ventre.**
- **Il se couche souvent pour se relever aussitôt, se roule sur le sol ou s'assoit sur les pattes arrière comme un chien.**
- **L'animal transpire.**
- **La douleur peut être permanente ou survenir par intermittence.**

**Si l'animal accuse les signes ci-dessus, prenez sa température (voir module 4) et son pouls.**

**Chez les chevaux, si la température dépasse 39,5 °C et si le pouls bat à plus de 60 coups par minute, l'animal est dans un état grave. Vous devez chercher immédiatement un vétérinaire.**

## **Les causes de la colique**

**La colique peut avoir différentes causes:**

- **Des vers parasites se trouvent dans l'appareil digestif.**
- **Les dents de l'animal sont défectueuses et il ne peut pas mastiquer**

**correctement sa nourriture.**

- **L'animal a brouté sur un sol sablonneux; le sable provoque la colique.**
- **L'animal a mangé trop de grain.**
- **L'animal a bu de l'eau quand il avait chaud et était fatigué par le travail.**

**Comment empêcher la colique**

**Vous pouvez empêcher la colique par les moyens suivants:**

- **Traitez l'animal régulièrement pour le débarrasser des parasites intestinaux (voir module 41).**
- **Vérifiez les dents de l'animal et demandez à votre vétérinaire de râper les dents trop aiguisées.**
- **Ne donnez pas d'eau aux animaux fatigués, qui ont chaud ou qui transpirent.**
- **Ne donnez pas trop de grain à l'animal.**

**Comment soigner un cheval qui a la colique**

**Faites marcher l'animal quelque temps et ne le laissez pas manger du fourrage. Administrez-lui un breuvage de sulfate de magnésium ou qu'huile végétale avec de l'eau (voir R22, annexe 1). Demandez l'aide du vétérinaire.**

## **Module 41: Les parasites internes des équidés**

***Les équidés souffrent d'un certain nombre de vers parasites vivant dans l'intestin et qu'on trouve parfois dans le crottin. Les larves de l'œstre vivent dans l'estomac et on les trouve aussi dans les excréments.***

***Les parasites provoquent une perte de poids et un mauvais état général. Chez les poulains, ils peuvent causer la diarrhée. Les infections vermineuses entraînent souvent la colique et peuvent provoquer la mort de l'animal.***

***Les strongles qui infectent les poumons provoquent des problèmes respiratoires et sont fréquents chez les ânes qui transmettent l'infection au cheval.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quels sont les vers parasites qui infectent les équidés.**
- 2 Quels sont les problèmes causés par les vers parasites chez les équidés.**
- 3 Comment traiter les infections vermineuses.**
- 4 Comment combattre les infections vermineuses chez les équidés.**
- 5 Ce qu'est l'œstre du cheval et quelle est son importance.**

### **Les vers parasites des équidés**

**Un certain nombre de vers infectent les intestins des équidés. Le plus gros est un nématode (ascaride) qui peut avoir plus de 30 cm de longueur; il produit des**




**millions d'œufs qui survivent très longtemps sur les pâturages.**

**Les strongles (jusqu'à 3 cm de long) sont des nématodes qu'on trouve aussi dans l'intestin. Ils vivent un certain temps dans le foie et les artères principales qui transmettent le sang à l'intestin. Ils passent finalement dans l'intestin où ils se nourrissent de la paroi.**

**On trouve souvent dans le crottin des vers blancs ayant jusqu'à 15 cm de longueur et munis d'une longue queue très mince. Ce sont les trichocéphales qui vivent dans l'intestin et pondent leurs œufs autour de l'anus de l'hôte où ils se développent avant de tomber au sol.**

**Les strongles pulmonaires infectent les poumons et sont fréquents chez les ânes qui peuvent en avoir un grand nombre. Les œufs sont ramenés dans la bouche par la toux, puis avalés pour être ensuite expulsés dans les excréments.**

### **Les vers parasites des équidés**



### **Problèmes résultant des infections vermineuses**

**Les gros nématodes ne sont pas souvent présents chez les animaux âgés de plus de 4 ans. Ils posent un problème chez le poulain où ils peuvent causer une perte de poids, un pelage terne, un mauvais état général et une colique en bloquant l'intestin. Les jeunes vers qui se déplacent dans le poumon provoquent la toux, et les lésions du poumon peuvent permettre à d'autres infections de se développer.**

**Les strongles sucent le sang et endommagent gravement la paroi de l'intestin. Les vers qui traversent les vaisseaux sanguins peuvent provoquer des lésions graves entraînant un affaiblissement des vaisseaux et un blocage. Les vers peuvent**

**causer une colique qui est souvent mortelle si elle n'est pas soignée.**

**Les trichocéphales provoquent une irritation de la région anale, ce qui rend l'animal agité et l'incite à frotter sa queue contre un mur ou un poteau. Les animaux infectés ne se nourrissent pas bien et peuvent avoir à la longue un mauvais état général.**

**Les strongles du poumon peuvent être présents en grand nombre chez l'âne sans qu'on en voie les signes. Toutefois, l'âne peut transmettre l'infection au cheval qui souffre de problèmes pulmonaires, de toux et d'écoulement aux naseaux. Les infections graves tuent les chevaux.**

### **Comment traiter les animaux infectés**

**On peut tuer les vers adultes en administrant un breuvage contenant du fenbendazole. L'haloxon peut aussi être utilisé pour traiter les vers dans l'intestin (voir R12, annexe 1).**

### **Prévention de l'infection vermineuse**

**Il existe plusieurs moyens de réduire le risque d'infection chez les animaux:**

- **L'évacuation des excréments sur les petits pâturages réduit le nombre des œufs qui les contaminent.**
- **Si on y fait paître d'autres animaux, il faut les laisser brouter l'herbe après les chevaux afin de réduire la contamination du pâturage. Les ruminants ne sont pas infectés par les parasites du cheval.**


- **Les écuries doivent être maintenues propres, le crottin étant évacué tous les jours. Les œufs de vers qui pourraient se trouver dans le crottin seront tués par la chaleur qui se forme quand celui-ci pourrit. En retournant le tas de crottin toutes les semaines ou tous les 15 jours, on s'assurera que la chaleur atteint tous les œufs et les tue.**
- **Un traitement régulier aux anthelmintiques (tous les trois mois, si possible) réduit le problème des vers.**

## **L'œstre du cheval**

**Les œstres pondent leurs œufs sur les poils en bas des jambes, les épaules et les alentours de la bouche. Les larves éclosent et pénètrent dans la bouche de l'animal quand il se lèche. Elles creusent des galeries dans l'intestin et se développent dans l'estomac où les larves de couleur rouge peuvent vivre jusqu'à un an. Les larves sont évacuées dans le crottin et pénètrent dans le sol où elles se métamorphosent en mouches adultes.**

**Les mouches adultes gênent l'hôte et les larves endommagent l'estomac, mais elles ne posent pas un problème aussi grave que les vers. On peut éliminer les œstres en administrant à l'animal un breuvage contenant de l'haloxon (voir R12, annexe 1).**

## **L'œstre du cheval**



## Module 42: Les affections de la peau et du pelage des équidés

***Les équidés peuvent souffrir de différents problèmes de la peau et du pelage, dont la gale, la teigne et des infections causées par d'autres germes.***

***Ces affections provoquent une grave irritation et peuvent se traduire chez l'animal par un mauvais état général et une réduction de l'appétit au travail.***

### Objectifs d'apprentissage

Après avoir étudié ce module, vous devez pouvoir reconnaître:

- 1 La gale chez les équidés.
- 2 Les infections dues aux poux.
- 3 Les problèmes causés par les tiques et les mouches.
- 4 La teigne chez les équidés.
- 5 La gale due à la pluie, la fièvre de la boue et les fissures des talons.

## **La gale chez les équidés**

**Plusieurs types d'acariens (comme de très petits insectes) peuvent infecter les équidés et provoquer la gale. Diverses parties du corps peuvent être atteintes, les différents états s'appelant ainsi:**

- **Gale du corps (commence sur la tête et l'encolure et s'étend à tout le corps).**
- **Gale du pied ou prurit de la jambe.**
- **Gale de l'oreille.**

**La gale provoque une vive irritation, des croûtes et des lésions de la peau ainsi qu'une perte de poids. A cause de l'irritation, les animaux sont difficiles à harnacher et à faire travailler. La gale du corps peut entraîner un mauvais état général qui aboutit à la mort.**

**L'acarien causant le problème ne peut être identifié que par votre vétérinaire qui examinera des raclures de peau au microscope. La gale peut être traitée au moyen d'une préparation contenant de l'hexachlorure de gamma benzène (voir Lindane, R15, annexe 1).**

**L'écurie, les harnais et le matériel de pansage doivent être parfaitement nettoyés et si possible désinfectés. N'oubliez pas que certains acariens de la gale peuvent infecter l'homme; vous devez donc vous laver à fond après avoir manipulé les animaux infectés.**

## **Infestations de poux**

**Les poux sucent le sang ou mordent la peau. On les observe habituellement autour de la naissance de la queue ou de la crinière (le poil sur le dessus de l'encolure). Ils causent de l'irritation et une chute des poils, mais on peut facilement les traiter à l'hexachlorure de gamma benzène (voir Lindane, R15, annexe 1).**

## **Tiques**

**Plusieurs types de tiques se nourrissent sur les équidés et attaquent les jambes, le ventre et les oreilles des animaux. Elles sucent le sang et peuvent transmettre des infections d'un animal à l'autre. On peut éliminer les tiques en les arrachant à la main, mais parfois leurs pièces buccales restent fixées à l'animal et causent des infections. Il est préférable d'enlever les tiques en les brûlant sur le dos avec une cigarette allumée, après quoi la tique se détache et tombe de l'hôte.**

## **Mouches**

**Les équidés sont gênés par les mouches qui cherchent à se nourrir de l'humidité sur le corps et du sang. Les animaux secouent la tête et piétinent le sol quand ils sont gênés.**

**Si l'animal porte une plaie ouverte, les mouches y déposeront leurs œufs tout autour, et les larves qui éclosent se nourriront du sang et de la chair. Il faut éliminer toutes les larves qu'on découvre et nettoyer parfaitement les plaies en les traitant à la teinture d'iode, au violet de gentiane ou avec un antibiotique et une poudre ou pulvérisation insecticide (voir R1, 5, 8, annexe 1).**

## **La teigne**

**La teigne provoque des croûtes blanchâtres rondes et une chute du poil. Elle peut affecter n'importe quelle partie du corps et les lésions peuvent s'agrandir et se rejoindre. La teigne cause une irritation et on peut la soigner en lavant les croûtes avec une solution iodée. Si l'infection persiste, demandez conseil à votre vétérinaire et n'oubliez pas que la teigne peut infecter l'homme; vous devez donc vous laver parfaitement après avoir manipulé les animaux.**

### **Fissures des talons ou fièvre de la boue et croûtes dues à la pluie**

**Ces affections sont toutes causées par le même germe qui infecte la peau quand elle ramollit après avoir été mouillée pendant une longue durée. La fièvre de la boue ou les fissures des talons se produisent sur les boulets et les talons, entraînant l'apparition de croûtes et de fissures sur la peau, qui produisent du pus. La pluie provoque de petites croûtes sur le dos, les épaules et l'encolure quand les animaux restent debout pendant de longues périodes sous la pluie.**

**Le traitement consiste à éliminer les croûtes en badigeonnant les plaies avec un antiseptique (voir R1, annexe 1). Les zones atteintes doivent être parfaitement séchées et l'on peut éviter cette affection en séchant la peau de l'animal quand elle est mouillée.**

### **Fissures des talons ou fièvre de la boue et croûtes dues à la pluie**

### **Module 43: Rut (œstrus), accouplement et gestation**

***On entend par rut (œstrus) la période pendant laquelle la femelle manifeste un désir du mâle.***



***Après un accouplement réussi, l'animal est gravide. La gestation dure 11 mois chez la jument et 12 mois chez l'ânesse.***

***Les ânesses et les juments peuvent être saillies pour engendrer des bardots ou des mulets.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez connaître:**

- 1 Les chaleurs et les signes de rut chez les équidés.**
- 2 L'accouplement chez les équidés.**
- 3 La gestation.**
- 4 Les soins à l'animal gravide.**
- 5 Les bardots et les mulets.**

## **Comment reconnaître le rut chez l'équidé**

**L'ânesse et la jument sont en rut au printemps ou au début de l'été.**

**La jument est en rut pour la première fois à l'âge d'environ 18 mois. Toutefois, il ne faut pas la laisser saillir avant l'âge de 3 ans; elle mettra bas alors à l'âge de 4 ans.**

**L'ânesse est en rut pour la première fois à l'âge de 1 an.**

**La jument est en chaleur pendant sept jours, tandis que l'ânesse est en chaleur pendant deux à sept jours. Pendant ce temps, la femelle acceptera le mâle. Il est préférable de laisser les animaux s'accoupler pendant les deux derniers jours de la**

**période de chaleurs. Les signes de chaleurs sont très nets. La femelle urine fréquemment et on observe un écoulement au vagin; elle montre un vif désir de s'accoupler.**

**Si l'accouplement n'entraîne aucune gravidité, la jument sera de nouveau en rut 14 à 16 jours plus tard, tandis que chez l'ânesse le rut survient de nouveau au bout de deux à trois semaines.**

### **Le coït ou accouplement**

**Il est très important de choisir un bon mâle pour le coït. Pour obtenir un bon poulain, il faut que les deux parents aient des caractéristiques génétiques satisfaisantes (voir annexe 4).**

**Si vous possédez des chevaux de valeur, il est bon de poser un tord-nez sur la jument et de l'entraver avant de lui amener l'étalon, faute de quoi elle pourrait lui donner des coups de pied et le blesser (voir module 37).**

### **La gestation**

**La gestation dure 11 mois chez la jument. L'abdomen sera enflé pendant les trois derniers mois de gravidité. La mamelle se développe pendant le dernier mois de la gestation. L'ânesse est gravide pendant 12 mois. Il ne faut pas monter sur les animaux gravides ni les faire travailler pendant les trois derniers mois de gestation.**

### **Les soins aux animaux gravides**

**L'animal gravide doit être bien nourri, en particulier pendant les trois derniers mois car le poulain risque de mourir si la mère n'est pas bien nourrie.**

## **Bardots et mulets**

**Le bardot est engendré par un cheval et une ânesse. La taille du bardot dépendra de celle de sa mère; plus l'ânesse est grande, plus le bardot le sera. Le mulet est issu de l'accouplement d'une jument et d'un âne. Les mulets sont des animaux puissants, tandis que les bardots ont de l'endurance.**

## **Module 44: Poulinage et soins aux jeunes animaux**

***Le poulinage ou mise bas est un processus naturel; les animaux n'ont généralement pas besoin d'aide à ce moment-là. Vous devez savoir reconnaître le moment où la jument est sur le point de mettre bas et veiller sur elle au cas où elle aurait des difficultés.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quels sont les signes indiquant que le moment du poulinage approche.**
- 2 Ce qu'est un poulinage naturel.**
- 3 Aider en cas de poulinage difficile.**
- 4 Soigner le jeune animal.**
- 5 Pratiquer la castration des jeunes mâles.**

## **Les signes du poulinage**

**L'augmentation de la taille de la mamelle est le signe le plus fiable de l'approche du poulinage. On peut voir s'écouler des trayons une sécrétion épaisse mais limpide, et la vulve est tuméfiée et détendue.**

**Placez la jument dans une écurie ou un abri, avec une litière abondante, pour qu'elle puisse mettre bas.**

### **Le poulinage naturel**

**La jument n'éprouve que rarement des difficultés à mettre bas; elle le fait habituellement la nuit en l'absence de quiconque.**

**La poche des eaux se rompt et les membres antérieurs apparaissent, suivis de la tête du poulain. Quand les épaules du poulain sont dégagées, vous pouvez retirer la membrane autour des naseaux pour aider le poulain à respirer. Parfois les membres postérieurs du poulain apparaissent les premiers, mais cela ne pose pas de problème.**

**Normalement, le placenta est expulsé dans l'heure qui suit la naissance du poulain. Vous devez vérifier qu'il a bien été expulsé dans les 24 heures après la naissance, faute de quoi vous devrez appeler immédiatement le vétérinaire.**

### **Difficultés lors du poulinage**

**Si vous constatez que la jument est en difficulté et si le poulain n'a pas fait son apparition ou s'il est dans une position anormale, vous devrez appeler le vétérinaire à l'aide. Il se peut que vous constatiez:**

- **Que seule la tête du poulain s'est dégagée de la mère.**
- **Que seule une jambe est sortie.**
- **Qu'il n'y a aucun signe du poulain.**

**Vous pourrez chercher à faciliter la mise bas de la même façon que pour le vêlage (voir module 19). Lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon, vérifiez que vos ongles, sont courts et brossez-les à fond. Savonnez-vous bien la main et introduisez-la dans le vagin pour déceler la cause du problème. Essayez d'y remédier comme pour un veau ou un agneau; ramenez les membres antérieurs du poulain et la tête dans la position correcte pour la naissance.**

**Si le cordon ombilical est attaché au poulain, il est souhaitable de le couper à 3 cm du corps du poulain. Attachez une ficelle propre autour du moignon du cordon et badigeonnez-le avec de la teinture d'iode ou du violet de gentiane (voir R1, annexe 1).**

### **Les soins au poulain**

**Le poulain doit être debout dans les 2 heures qui suivent la naissance et téter dans les 4 heures. Il est indispensable que le poulain prenne immédiatement le colostrum de sa mère; si le poulain a de la difficulté à téter, vous devez traire le colostrum de la jument en le recueillant dans un récipient propre et le donner au poulain au biberon. Si un poulain n'a pas absorbé le colostrum dans les 8 heures, il risque d'être infecté.**

**Les poulains sont sevrés au bout de 10 mois si la mère redevient gravide. Sinon, on peut laisser le jeune animal téter sa mère jusqu'à l'âge de 20 mois.**

**Il faut habituer le poulain à porter un collier dès le jeune âge et à être attaché. Quand vous attachez des animaux, utilisez un nœud de sécurité (voir «Nœuds et mise au piquet», annexe 3) afin qu'ils puissent être rapidement libérés au besoin.**

## **Castration du poulain**

**Le jeune mâle (poulain) doit être châtré à l'âge de 2 mois. On peut aussi pratiquer la castration sur des animaux âgés de 2 à 3 ans.**

**Si votre communauté a beaucoup d'équidés, il est souhaitable que vous achetiez un émasculateur; c'est un outil qui écrase et sectionne le cordon testiculaire. La castration peut être pratiquée avec un couteau, mais elle doit être faite par un vétérinaire; quand il s'agit de châtrer des équidés, vous devez demander conseil et assistance.**

## **Module 45: Ecurie et pâturage**

***Les équidés, en particulier les chevaux, peuvent être maintenus à l'écurie quand ils ne travaillent pas.***

***Ils peuvent être laissés dans une prairie, avec un abri qui les protégera des intempéries.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

**1 Ce qui est nécessaire dans une bonne écurie.**

**2 Comment tenir l'écurie propre.**


**3 Ce qui est nécessaire Pour laisser les animaux dans une prairie.**

## **Les écuries**

**Les chevaux sont souvent gardés à l'écurie quand ils ne travaillent pas. Une bonne écurie peut être construite en bois, en brique ou en béton; elle doit avoir un sol en dur avec une inclinaison assez douce vers la porte pour laisser s'écouler l'urine au dehors.**

**L'écurie doit être assez grande pour permettre à l'animal de s'y mouvoir, de se coucher et de se rouler sur le dos. La surface de l'écurie doit être d'au moins 3,5 m × 3 m. Les petits animaux auront besoin de moins d'espace. Une écurie où l'animal se meut librement est appelée un box. La porte du box doit être en deux parties, afin que la partie supérieure puisse être laissée ouverte pendant la journée pour permettre à l'air frais de pénétrer dans l'écurie et à l'animal de voir ce qui se passe autour de lui.**


## **Les écuries**



**Les fourrages concentrés pour le cheval en écurie sont placés dans une mangeoire (une auge) qui est fixée à un mur à au moins 60 cm au-dessus du sol. Le foin est placé dans un râtelier formé de barreaux en bois ou en métal fixés au mur à au moins 1 m de hauteur. Le foin peut aussi être placé dans un filet de cordage suspendu à un crochet ou à un anneau dans le mur. Il faut fixer un anneau métallique au mur pour pouvoir attacher l'animal quand il est pansé ou examiné. L'eau sera fournie dans un seau solide placé dans un angle de l'écurie avec un barreau en bois pour le maintenir en place.**

## **Abri**





**Les animaux doivent avoir de l'ombre et un abri. Les arbres donnent de l'ombre, et l'abri peut consister en un édifice à trois côtés en bois ou en tôle. Au besoin, les animaux peuvent être nourris de foin ou de concentré dans l'abri.**

### **Comment maintenir l'écurie propre**

**La mangeoire et les seaux doivent être vidés et nettoyés tous les jours, et il faut renouveler l'eau. Il faut prévoir une bonne litière de paille, de sciure, de copeaux de bois ou de sable propre, assez profonde pour que le sol du box ne soit pas mis à nu par les mouvements de l'animal.**


**Il faut retirer tous les jours la litière souillée et le crottin, et en faire un tas de fumier dehors. On ajoutera de la litière fraîche dans le box. L'évacuation du crottin contribue à réduire les problèmes dus aux mouches et le risque d'infection par des parasites. La litière doit être complètement renouvelée quand c'est possible. Le tas**

**de fumier pourrit et dégage de la chaleur qui tue les œufs des vers parasites. Une fois bien pourri, le fumier peut être utilisé comme engrais.**

### **Le maintien des équidés au pâturage**

**Les prairies destinées aux équidés doivent être bien clôturées. La clôture doit être solide et peut être constituée de poteaux avec des barreaux ou du fil de fer. Si on utilise du fil de fer, le fil du bas doit être à au moins 30 cm au-dessus du sol pour éviter que les animaux ne s'y prennent les pieds. Une bonne haie solide que les animaux ne peuvent pas traverser agira non seulement comme une barrière, mais aussi comme un abri contre le vent. Les haies doivent être faites d'épineux ou d'autres buissons solides disposés en deux rangées parallèles.**

### **Le maintien des équidés au pâturage**



**Il faudra fournir de l'eau dans un abreuvoir ou un seau solide qu'on devra remplir tous les jours. Le seau peut être placé dans un vieux pneu pour éviter qu'il ne soit renversé.**

**Une bonne idée serait de clôturer la prairie en trois zones. Un tiers peut être utilisé pour le pacage pendant que le reste est au repos ou sert à la fenaison. L'élimination du crottin dans le pâturage réduira la contamination par les œufs des vers. Les ânes et les chevaux peuvent être mis au piquet pour paître, puis déplacés dans une zone différente chaque jour.**

### **Module 46: Le fourrage et l'eau pour les équidés**

***Les équidés ont un estomac non compartimenté. Ils mangent de l'herbe et des***

## ***plantés souples et ils ont besoin de grain comme aliment supplémentaire.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez connaître:**

- 1 La quantité de fourrage nécessaire au cheval qui ne travaille pas.**
- 2 La quantité de fourrage nécessaire au cheval qui travaille.**
- 3 Les besoins en eau des équidés.**

### **L'affouragement de l'équidé qui ne travaille pas**

**Tous les équidés ont les mêmes besoins de fourrage. S'ils ne travaillent pas ou ne sont pas en gestation, il faut les laisser paître moins quelques heures par jour sur de bons herbages. On peut leur donner du foin la nuit.**

### **L'affouragement de l'équidé qui travaille**

**L'âne et le mulet qui travaillent auront besoin de 1 kg de fourrage concentré en plus de l'herbe et du foin. Les chevaux qui travaillent auront besoin de 2 kg de fourrage concentré en plus de l'herbe et du foin. Un cheval de trait lourd peut avoir besoin de 4 kg de concentré.**

**Le millet, le blé, l'orge, le riz et le maïs sont de bons aliments concentrés pour les équidés, et on peut leur donner de l'avoine broyée en petites quantités. L'orge est très utile; on peut la donner broyée, ou bien avec le grain entier après l'avoir fait bouillir et laissé refroidir. L'orge est un bon fourrage si on la laisse tremper toute**

**la nuit, après quoi elle doit être égouttée et donnée aux chevaux, additionnée d'une poignée de sel. Quand un cheval est nourri à l'orge, la présence de grains entiers dans le crottin indiquera que l'animal a un problème dentaire et ne mastique pas correctement sa nourriture.**

**Si on dispose de son d'avoine, on peut le donner à l'Etat humide (légèrement arrosé d'eau); il agit alors comme laxatif, mais si le son est consommé à l'Etat sec il aide à la régularisation du transit intestinal, et les excréments ont alors un aspect normal.**

**On peut ajouter des légumes au fourrage. Les carottes doivent être coupées en rondelles, mais les navets peuvent être donnés entiers. On peut couper fin des déchets de légumes, par exemple les pelures de pommes de terre et de pommes, les fanes de carottes et les feuilles de choux, et les ajouter au fourrage.**

## **L'eau**

**Il faut donner aux animaux de l'eau de boisson propre tous les jours. Un cheval a besoin de 25 à 30 litres d'eau par jour, mais il lui en faudra moins quand il broute de l'herbe bien verte. Le cheval aura besoin de plus d'eau quand le fourrage est sec ou par temps très chaud. Il faut davantage d'eau pour les juments gravides ou allaitantes.**

***Ne donnez pas d'eau aux animaux fatigués ou en transpiration car cela peut provoquer la colique. Faites marcher les animaux et laissez-les se rafraîchir quelque temps avant de leur donner de l'eau à boire.***

## **Module 47: Pansage et harnais**

***On appelle pansage le nettoyage et le brossage du pelage de l'animal, ce qui aide à lui conserver la santé et à éviter les problèmes de peau.***

***On entend par harnais le matériel utilisé sur l'animal pour l'équitation (sellerie) ou l'attelage.***

## **Objectifs d'apprentissage**


**Après avoir étudié ce module, vous devez pouvoir:**

- 1 Panser les animaux.**
- 2 Soigner les animaux mouillés par les intempéries.**
- 3 Choisir les harnais et la sellerie à utiliser.**
- 4 Empêcher les plaies résultant d'un harnais mal posé.**

## **Pansage (brossage) des équidés**

**Les animaux doivent être pansés tous les jours. On utilise une brosse manuelle solide pour éliminer du pelage les poils qui se sont détachés et les souillures. Après deux ou trois coups de brosse, on enlève les souillures et les poils de la brosse en la frottant sur une étrille métallique. Il est important de supprimer la boue et les saletés sur les jambes et les pieds, faute de quoi le cheval aura de la fièvre (voir module 42). Les sabots doivent être examinés tous les jours et nettoyés au cure-pied. Il faut panser légèrement les animaux avant de leur poser un harnais ou une selle pour éviter que des saletés ne soient prises en dessous et ne provoquent des problèmes de peau.**

## Pansage (brossage) des équidés



### Soins à donner à l'animal mouillé par les intempéries


Quand un animal retourne à l'écurie trempé par la sueur, la pluie ou la neige, il faut le sécher immédiatement, faute de quoi il tombera malade. On doit retirer l'eau du pelage au moyen d'un grattoir métallique muni d'une poignée qu'on tire sur le pelage. Vous pouvez aussi supprimer l'eau en tordant une poignée de paille ou de foin en arc de cercle et en frottant de haut en bas. Vous utiliserez ensuite de la paille, des chiffons ou une vieille couverture pour sécher l'animal en lui frottant le corps.

## Harnachement des animaux au travail


Pour utiliser l'animal en attelage, il faut lui poser un harnais. Les mulets, les ânes et les chevaux doivent porter un collier pour tirer les outils agricoles ou les charrettes. Un cheval peut aussi tirer des chargements en portant une ventrière. Les mulets et les ânes peuvent porter des fardeaux pesant jusqu'à 100 kg et tirer des charrettes de 300 kg. Les chevaux sont plus robustes et peuvent tirer ou porter des chargements plus lourds, mais il peut être plus difficile de leur apprendre ce travail. Les colliers, ventrières et brides (avec têtière) doivent être posés correctement et il ne faut pas les laisser frotter l'animal.

### Harnachement des animaux au travail

Bât avec  
chargement



Collier



## Sellerie

Une selle doit toujours être correctement ajustée et elle ne doit pas avoir des



**bords raides ou rugueux qui pourraient frotter contre l'animal. Il est préférable de placer une toile sous la selle, surtout par temps chaud; le coton absorbera la sueur.**

**Après une chevauchée, quand l'animal a chaud et transpire, vous devez détacher immédiatement la ventrière, mais laissez la selle en place pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que l'animal ait moins chaud.**

### **Plaies dues à un harnais mal ajusté**

**Un mauvais ajustement des selles, des colliers, des entraves et des ventrières provoquera des blessures qui donneront des plaies. Une selle mal ajustée provoquera des plaies, et des écorchures apparaîtront si la ventrière est mal ajustée. Le poil sera éliminé par frottement, et une plaie se formera et s'infectera.**

**Le harnachement et la sellerie doivent toujours être bien propres; en les posant sur l'animal, il faut veiller à ce que l'équipement s'ajuste correctement sans provoquer de frottement et qu'aucun repli de la peau ne soit pincé sous la ventrière.**

**Si l'animal est blessé, il faudra le laisser au repos, nettoyer les plaies et les badigeonner avec de la teinture d'iode ou une solution de Dettol (voir module 73).**

### **[Plaies dues à un harnais mal ajusté](#)**

***N'oubliez pas que le manque de soins et l'utilisation d'un harnais mal ajusté peuvent rendre l'animal inapte au travail.***

## Module 48: La peste équine

***La peste équine est une maladie infectieuse des chevaux, des mulets et des ânes. Elle entraîne la mort de beaucoup d'animaux. Bien qu'elle soit appelée peste équine africaine, cette maladie est également rencontrée en Asie.***

### Objectifs d'apprentissage

Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:

- 1 Ce qu'est la peste équine.
- 2 Quelles précautions prendre pour se prémunir contre la peste équine.

### La peste équine

**La peste équine est une maladie propagée par les moustiques; elle atteint les mulets, les chevaux et les ânes. Les signes de la maladie sont variables car elle est causée par un certain nombre de germes différents.**

**Le premier signe de la maladie est une fièvre où la température atteint 41 °C. La maladie peut ensuite atteindre le cœur, les poumons ou à la fois le cœur et les poumons, selon le germe qui cause l'infection.**

**Un animal infecté par la forme pulmonaire de la maladie tousse et a du mal à respirer, mais le signe principal qui indique que l'infection est la peste équine est la production d'un abondant écoulement jaune aux naseaux. L'animal infecté ne tarde pas à mourir.**

**L'animal qui est infecté par la forme cardiaque de la maladie a les yeux rouges et gonflés. La tête et l'encolure sont bientôt tuméfiées également, et on observe une tache de sang sous la langue. Les animaux infectés par cette forme de la peste équine peuvent mourir ou se rétablir dans les deux semaines qui suivent l'apparition des premiers signes de la maladie.**

**Les animaux infectés à la fois par la forme cardiaque et la forme pulmonaire de la maladie souffrent d'un gonflement des yeux, de la tête et de l'encolure, ainsi que d'un écoulement abondant aux naseaux. Certains d'entre eux peuvent survivre.**

**Précautions à prendre pour se prémunir contre la peste équine**

**Il n'existe aucun traitement pour cette maladie. La vaccination est recommandée, mais il ne faut pas la pratiquer sur un animal gravide.**

**S'il y a des équidés dans votre communauté, parlez à votre vétérinaire et prenez des dispositions pour qu'ils soient vaccinés.**

***N'oubliez pas que cette maladie est mortelle et peut rapidement se propager à tous les équidés de votre communauté s'ils ne sont pas vaccinés.***



## Chapitre 6: Poulets et canards

---

[Module 49: L'élevage des poulets et des canards](#)

[Module 50: Le logement des poulets et des canards](#)

[Module 51: L'alimentation des poulets et des canards](#)

[Module 52: Problèmes dus à une alimentation déficiente \(carences\)](#)

[Module 53: Incubateurs et couveuses](#)

[Module 54: La couvaion](#)

[Module 55: Les parasites internes des poulets et des canards](#)

[Module 56: Les parasites externes des poulets et des canards](#)

---

### Module 49: L'élevage des poulets et des canards

***Il n'est pas bon de laisser les poulets, les canards et d'autres volailles divaguer librement dans la communauté pour manger et boire tout ce qu'ils peuvent trouver.***

***Si on fournit à ces oiseaux un abri, de la nourriture et de l'eau propre, on obtiendra plus de viande et d'œufs.***

***La volaille tombe aisément malade, et certaines maladies peuvent tuer de nombreux oiseaux. Il est indispensable d'obtenir l'avis du vétérinaire sur les vaccinations qui empêcheront les maladies.***

### Objectifs d'apprentissage

**Après avoir étudié ce module, vous devez connaître:**

- 1 L'aviculture traditionnelle.**
- 2 De meilleurs moyens d'élever les poulets et les canards.**
- 3 La qualité des œufs.**
- 4 La vaccination et l'assistance vétérinaire pour les poulets et les canards.**

## **L'aviculture traditionnelle**

**De nombreuses communautés élèvent de la volaille en vue d'obtenir de la viande et des œufs pour les festins, les mariages, etc. Parfois, les oiseaux sont vendus afin d'obtenir le complément d'argent nécessaire pour des médicaments urgents ou de la nourriture. Beaucoup de gens dans la communauté élèvent des volailles mais n'obtiennent pas des résultats réellement satisfaisants. Cela peut être dû aux causes suivantes:**

- Les oiseaux ne sont pas bien nourris; on les laisse picorer ce qu'ils trouvent et boire de l'eau polluée.**
- Ils n'ont pas d'abri et sont exposés au froid, à la pluie, aux renards et à d'autres prédateurs.**
- La communauté n'élève que des types (races) de volailles de petite taille ou qui ne pondent pas beaucoup d'œufs.**

**A cause de ces méthodes d'élevage, la plupart des jeunes oiseaux meurent, et très peu d'entre eux atteignent l'âge de 1 an. Les volailles qui survivent sont de petite taille et n'ont que peu de chair. Il faut en tuer beaucoup pour obtenir des quantités**

**de viande suffisantes, et leur vente ne rapporte pas beaucoup d'argent.**

**De meilleurs moyens d'élever les poulets et les canards**

**Vous pouvez améliorer la quantité de viande et d'œufs obtenue de vos volailles par les moyens ci-après:**

- **En élevant de meilleures races de volailles, qui sont de plus grande taille et pondent plus d'œufs.**
- **En améliorant la qualité des volailles par l'accouplement avec de meilleurs mâles.**
- **En fournissant aux volailles un abri, de la nourriture satisfaisante et de l'eau saine.**

**Vous devrez chercher à savoir quelles sont les races disponibles afin d'obtenir des oiseaux de plus grande taille, qui produisent plus de viande et pondent plus d'œufs. Vous devrez encourager la communauté à élever ces volailles, ou du moins à en utiliser quelques-unes pour améliorer les oiseaux qu'elle possède. Il y a plusieurs façons d'introduire des oiseaux de meilleure qualité dans les élevages de la communauté:**

- **Acheter des oiseaux mâles de race supérieure qui s'accoupleront avec les femelles que vous possédez.**
- **Acheter des poussins de 1 jour de la race supérieure et les élever.**


- **Acheter quelques oiseaux âgés de 2 à 3 mois (c'est la meilleure méthode).**

## **La qualité des œufs**

**Les œufs de poule restent frais plus longtemps que les œufs de cane. Les œufs doivent être conservés dans un endroit frais. S'ils sont placés au réfrigérateur, les œufs de poule resteront frais pendant trois semaines, tandis que les œufs de cane devront être consommés dans les 10 jours.**

- **Un œuf pondu par une femelle élevée sans mâle est dit non fécondé; il restera frais pendant longtemps.**
- **Les œufs provenant d'une femelle élevée avec un oiseau mâle sont vivants; les poussins commenceront à se développer à l'intérieur si les œufs sont conservés dans un endroit chaud.**
- **Pour vérifier les œufs, examinez-les à contre-jour par rapport à une source lumineuse ou au soleil, ou mirez-les (voir module 53).**

**Œuf non fécondé - Œuf fécondé**




**Il faut nettoyer les œufs avant de les vendre ou de les consommer. Essuyez-les avec une toile humide, mais ne les lavez jamais à l'eau chaude. Si les œufs sont placés dans un récipient contenant de l'eau propre et froide, les mauvais œufs (qu'il ne faut pas manger) flotteront à la surface de l'eau. Les œufs qu'on peut consommer resteront au fond. Quand vous utilisez des œufs, l'Etat du jaune et du blanc de l'œuf vous indique s'il est bon à consommer.**

### **La qualité des œufs**





Œuf bon à  
consommer



Œuf mauvais



Œuf très mauvais

## Vaccination et assistance vétérinaire pour les poulets et les canards

**Vous devrez parler à votre vétérinaire local pour découvrir quelles sont les maladies des volailles dans votre région. Il pourra vous dire quoi faire pour empêcher la maladie et obtenir tous les vaccins que vous pourrez ensuite utiliser pour protéger la volaille contre ces infections.**

***Prenez l'aviculture au sérieux. Cet élevage présente les mêmes avantages que celui d'autres animaux***

## Module 50: Le logement des poulets et des canards

***Si on laisse la volaille divaguer librement, la maladie peut se propager rapidement à tous les oiseaux élevés par la communauté.***

***La première étape pour améliorer la volaille consiste à la garder dans un endroit clôturé et à lui fournir un abri.***

***Un abri couvert (poulailler) protégera les poulets et les canards du vent, de la***

## ***pluie, de la neige et des prédateurs comme les renards.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Pourquoi il faut mettre à l'abri les poulets et les canards.**
- 2 Combien d'oiseaux on peut élever ensemble dans un poulailler.**
- 3 Comment construire un poulailler pour la volaille.**
- 4 Comment doit être un enclos grillagé.**
- 5 Ce qu'est un pondoir.**
- 6 Quelle est la différence entre le logement des poulets et celui des canards.**

**Pourquoi nous prévoyons un logement pour les poulets et les canards**

**Si les poulets et les canards restent à l'abri:**

- Ils sont protégés du soleil, de la pluie, du froid et de la neige.**
- Ils sont protégés contre d'autres animaux comme les renards et les oiseaux de proie, et aussi contre les voleurs et les accidents de la route.**
- Les jeunes oiseaux sont protégés.**
- On peut contrôler la distribution de nourriture et d'eau.**
- On peut empêcher la volaille de manger de la nourriture défectueuse ou**

## **de boire de l'eau polluée.**

- **On peut fournir à la volaille des pondoirs qui facilitent le ramassage des œufs.**
- **On peut interrompre la propagation de la maladie.**

## **Combien d'oiseaux faut-il mettre dans un poulailler?**

**Il faut un espace suffisant pour tous les oiseaux, ainsi que pour les auges contenant la nourriture et l'eau. Si la volaille est trop entassée, les oiseaux commenceront à se donner des coups de bec. Si certains se mettent à saigner, le problème s'aggraverait car d'autres oiseaux commenceront à donner des coups de bec. Les jeunes oiseaux ont besoin de moins d'espace que les oiseaux plus âgés, et il faut installer des perchoirs où les poulets se jucheront la nuit.**

## **L'espace nécessaire au sol est le suivant:**

- **On peut élever 50 poulets sur une surface de 16 m<sup>2</sup> (4 m × 4 m).**
- **Il faut 1 m de perchoir pour chaque groupe de cinq poulets adultes.**

## **Le logement des poulets**

### **Pour être satisfaisant, le poulailler doit répondre aux conditions suivantes:**

- **Il doit être construit sur une éminence à proximité du domicile de l'éleveur qui pourra ainsi le surveiller.**
- **Le poulailler doit avoir 2 m de hauteur. et il est préférable que, jusqu'à**


Le poulailler doit avoir 2 m de hauteur, et il est préférable que, jusqu'à 50 cm de hauteur, les murs soient en brique, en pierre ou en béton, le reste étant en bois, en bois et grillage, en tôle ondulée ou tout autre matériau approprié. On peut fabriquer de petits poulaillers avec du bois et du grillage.

### **Poulaillers (enclos grillagés)**

Tout poulailler doit donner sur un espace où la volaille peut faire de l'exercice et picorer l'herbe, les insectes, etc. Cet enclos doit être entouré d'un grillage ou d'un autre matériau approprié et, si possible, ombragé par quelques arbres. Une partie peut être couverte pour que la volaille s'y abrite les jours de pluie. Si possible, cet espace doit être divisé en deux parties dont l'une sera interdite aux oiseaux pour laisser repousser l'herbe.

**Pour 50 poulets, il faut prévoir un poulailler de 16 m<sup>2</sup> et un enclos de 500 m<sup>2</sup>.**

### **Poulaillers (enclos grillagés)**



## Pondoirs


**On appelle pondoirs des boîtes où la poule peut pondre ses œufs. Le pondoir peut être en bois, en grosse vannerie ou en poterie. Il faut tapisser ce nid de paille ou de foin. Les boîtes en bois peuvent être fixées sur le côté du poulailler avec une ouverture vers l'extérieur où l'on ramassera les œufs.**

## Le logement des canards

**Les poulaillers peuvent servir aussi aux canards. Toutefois, si vous élevez des canards vous ne devez pas oublier ce qui suit:**

- **Les canards n'ont pas besoin de perchoir, et les pondoirs doivent être assez bas pour que les canards puissent les utiliser, ou bien on disposera une rampe pour que les canards puissent y accéder.**

## Le logement des canards



- Il faudra fournir aux canards un récipient d'eau au moins assez grand pour qu'ils puissent y plonger la tête et le cou.
- Il faut laisser les canes qui pondent dans leur logement chaque matin jusqu'à ce qu'elles aient pondu.

## Module 51: L'alimentation des poulets et des canards

***Pour obtenir de la volaille une production satisfaisante de viande et d'œufs, il faut lui donner une nourriture appropriée contenant les nutriments nécessaires.***

***Si on laisse les oiseaux divaguer librement et picorer ce qu'ils peuvent glaner, ils ne grandiront pas correctement et ne produiront que peu de viande et d'œufs.***

### Objectifs d'apprentissage

## **Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Comment fonctionne l'appareil digestif des oiseaux.**
- 2 Ce que doit contenir la nourriture de l'oiseau.**
- 3 Quelles sont les différentes nourritures pour les poulets et les canards.**
- 4 Quelles sont les rations pour les poulets et les canards.**
- 5 De quelle quantité d'eau les oiseaux ont besoin.**


### **L'appareil digestif de l'oiseau**

**L'oiseau n'a pas de dents; la nourriture est avalée telle quelle, et elle va dans le jabot où elle est emmagasinée et mélangée avec de la salive. En palpant le jabot, vous savez si un oiseau a mangé ou non.**

**La nourriture passe du jabot au ventricule succenturié où elle se mélange aux sucs avant de passer dans l'organe musculaire arrondi aux parois épaisses qu'on appelle le gésier. Le gésier contient de petits cailloux que l'oiseau a avalés pour que la nourriture y soit broyée en vue de la digestion. Les nutriments sont absorbés à mesure que la nourriture broyée parcourt l'intestin.**

### **L'appareil digestif de l'oiseau**

### Appareil digestif de l'oiseau



**Les oiseaux ne produisent pas d'urine liquide. Les déchets provenant des reins forment une matière blanche épaisse qui est mélangée à la fiente. Ces deux matières sont ensuite évacuées par le cloaque. Le canard produit des excréments plus humides que ceux du poulet.**

**Ce dont l'oiseau a besoin dans sa nourriture**

**Comme les autres animaux, les oiseaux ont besoin de glucides, de protéines, de matières grasses, de minéraux et de vitamines dans leur nourriture (voir module 23).**



**Aux différentes époques de leur vie, les oiseaux auront besoin de rations qui contiennent différentes quantités de glucides, de protéines, de matières grasses, de minéraux et de vitamines:**

- **Depuis l'éclosion (poussins de 1 jour) à l'âge de 3 mois, les oiseaux auront besoin d'une nourriture qui contient de grandes quantités de protéines pour assurer la croissance de l'organisme.**
- **Quand les oiseaux pondent des œufs, les minéraux sont importants pour produire de bons œufs.**
- **Les volailles élevées pour leur chair auront besoin de beaucoup de protéines dans leur nourriture.**

## **L'alimentation des oiseaux**

**Différents aliments sont importants pour les nutriments qu'ils contiennent.**

- **On trouve les glucides dans les céréales qui peuvent être données à la volaille sous forme de grains entiers ou de farine. On peut nourrir la volaille de blé, de riz, de maïs d'orge, d'avoine, de sorgho, d'éleusine et de millet perlé ou de son de riz ou d'autres céréales.**
- **Les tourteaux provenant de la transformation des arachides, des graines de coton ou des dattes peuvent également fournir des glucides et des protéines. La farine de soja contient elle aussi des protéines. Ces types d'aliments riches en protéines proviennent de végétaux, mais les produits d'origine animale comme la farine de poisson, le lait en poudre et**

**la farine de sang contiennent aussi des protéines et peuvent être donnés en nourriture aux oiseaux.**

- **Il ne faut pas donner aux oiseaux trop de protéines animales. Non seulement celles-ci coûtent cher, mais de plus elles peuvent provoquer certaines maladies chez les animaux. Si la volaille mange trop de farine de poisson, les œufs auront un goût de poisson.**
- **On trouve les matières grasses dans les graines de coton, les arachides et le tournesol.**
- **Les minéraux se trouvent dans la poudre d'os, les coquilles d'œufs et les vieux coquillages qui peuvent être broyés et ajoutés à la nourriture. Si on dispose sur place d'os de seiche, c'est une excellente source de minéraux.**
- **On fournira des vitamines en ajoutant à la nourriture de la verdure ou des vitamines vendues dans le commerce.**

***Votre vétérinaire pourra vous conseiller au sujet des suppléments vitaminés disponibles dans le commerce et il vous montrera comment les utiliser.***

**Vous pouvez donner à la volaille vos déchets alimentaires s'ils sont hachés fin et bouillis. Ils seront alors mélangés à de la farine avant d'être donnés en nourriture aux oiseaux.**

## **Rations**

**La ration changera en fonction des besoins de l'oiseau. Les jeunes oiseaux ont besoin d'une ration riche en protéines, tandis que les pondeuses ont besoin de beaucoup de minéraux. Voici quelques exemples de rations:**

<b>Age de l'oiseau</b>	<b>Grains de céréales entiers ou broyés</b>	<b>Tourteaux d'origine végétale ou animale</b>	<b>Protéines</b>	<b>Minéraux</b>
<b>Jusqu'à 8 semaines</b>	<b>7 parties</b>	<b>2 parties</b>	<b>1 partie</b>	<b>0,25 partie</b>
<b>8 - 12 semaines</b>	<b>8 parties</b>	<b>1,5 partie</b>	<b>1 partie</b>	<b>0,25 partie</b>
<b>Pondeuse</b>	<b>8 parties</b>	<b>5 partie</b>	<b>1,5 partie</b>	<b>0,25 partie</b>

**La ration doit être bien malaxée, puis on y ajoute de l'eau pour qu'elle forme des miettes avant d'être donnée en nourriture aux poulets ou aux canards.**

**Pour les poulets, on peut jeter du grain entier dans tout l'enclos afin d'encourager la volaille à gratter le sol en se nourrissant et ainsi à en retirer des minéraux. On peut offrir aux canards des grains entiers dans une auge d'eau ou les distribuer secs.**

**Evacuez tous les jours la nourriture non utilisée. On peut suspendre des légumes verts dans l'enclos du poulailler pour encourager la volaille à s'y intéresser et à ne pas se donner des coups de bec.**

**L'eau**

**La volaille a besoin d'eau propre et fraîche à tout moment. Pour quatre poulets, il faut prévoir 1 litre d'eau chaque jour et le double si le temps devient plus chaud.**

**Les canards ont besoin de plus d'eau que les poulets chaque jour. Ils se portent mieux s'ils ont assez d'eau pour y plonger la tête et le cou.**

## **Module 52: Problèmes dus à une alimentation déficiente (carences)**

***On entend par carence le fait qu'un oiseau n'absorbe pas une quantité suffisante d'un nutriment donné. Tous les animaux peuvent connaître des problèmes de carence, mais chez les oiseaux une carence se traduit très vite par les signes suivants:***

- ***Mauvais état de santé***
- ***Plumage médiocre***
- ***Coquilles d'œufs trop minces***
- ***Problèmes de pattes***
- ***Baisse de la production d'œufs***
- ***Infections fréquentes***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Ce qu'est une carence en protéines.**
- 2 Quels sont les problèmes causés par une absence de minéraux.**
- 3 Quels sont les problèmes causés par l'avitaminose.**

## **Carence en protéines**

**Si la nourriture contient trop peu de protéines (animales ou végétales), les oiseaux s'affaiblissent et peuvent avoir des infections. Ils ne poussent pas bien et la production de viande est médiocre. La ponte diminue ou cesse.**

## **Carence en minéraux**

**L'absence de calcium dans la nourriture peut avoir les effets suivants:**

- **Les os des pattes se recourbent, si bien que l'oiseau ne peut plus marcher correctement.**
- **Les oiseaux pondent des œufs à coquille molle ou sans coquille.**

**Si les œufs n'ont pas de coquille ou si leur coquille est molle, ils se briseront et seront mangés par les autres oiseaux. En pareil cas, le poulet peut acquérir l'habitude de manger des œufs, ce qui ne tarde pas à poser un problème.**

**Pour empêcher cela, il faut donner aux oiseaux beaucoup de minéraux sous forme de poudre de coquillages ou d'os. Si on laisse la volaille picorer le grain, elle absorbera à partir du sol de l'enclos les minéraux dont elle a besoin. Des coquilles d'œufs broyées constituent une bonne source de minéraux pour les oiseaux.**

## **Problèmes causés par une absence de vitamines**


**Si la nourriture ne contient pas de vitamines:**

- **Les oiseaux ne poussent pas bien, ils sont affaiblis, ne peuvent pas se mouvoir correctement, et leur plumage est ébouriffé.**
- **Des problèmes pulmonaires peuvent surgir et on observe chez les oiseaux des écoulements aux narines et aux yeux.**
- **Les doigts tournent vers l'intérieur et les oiseaux ont du mal à se déplacer.**

**On peut éviter ces problèmes en ajoutant à la nourriture des vitamines achetées dans le commerce ou en donnant des légumes verts aux oiseaux en plus de leur nourriture. L'avitaminose peut inciter les oiseaux à s'arracher le plumage, ce qui ne tarde pas à poser un problème.**

### **Problèmes causés par une absence de vitamines**

#### **Effets des carences**



## **Module 53: Incubateurs et couveuses**

***Le moyen le plus simple de couvrir les œufs est l'incubation naturelle par l'oiseau femelle. Pour faire éclore un grand nombre d'œufs, vous pouvez utiliser un petit incubateur qui est chauffé au pétrole ou à l'électricité.***

***On peut vérifier l'Etat des œufs dans l'incubateur par la méthode du mirage (c'est-à-dire en observant les œufs à contre-jour).***

***Après l'éclosion, on met les poussins dans une couveuse munie d'un système de chauffage et on y place des auges pour la nourriture et l'eau.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Comment utiliser un incubateur.**
- 2 Comment vérifier les œufs par mirage.**
- 3 Comment élever les poussins dans une couveuse.**
- 4 Quels types d'auges utiliser pour la nourriture et l'eau.**

### **Incubateurs (pour faire éclore les œufs)**

**Si votre communauté possède un petit incubateur, vous pourrez faire incuber les œufs et les faire éclore avec de bons résultats en procédant ainsi:**

- Choisissez des œufs de taille moyenne et dont la coquille n'est pas trop mince ni fissurée.**

- **Faites fonctionner l'incubateur d'abord pendant quelques jours pour vérifier que la température reste constante à 39,5 °C.**
- **Veillez à ce que l'incubateur soit bien horizontal et que la température de la pièce où il se trouve reste relativement constante (15-20 °C).**
- **Veillez bien à ce que vous ayez assez de pétrole ou que votre distribution d'électricité soit fiable.**
- **Veillez à ce que le thermomètre soit au niveau des œufs.**
- **Vérifiez l'humidité et veillez à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans le plateau à l'intérieur de l'incubateur.**
- **Ne touchez pas les œufs avec des mains sales, ni après avoir manipulé du pétrole.**
- **Retournez les œufs deux fois par jour pendant les 18 premiers jours et déplacez-les (comme le ferait la poule couveuse).**

**La durée d'incubation pour les poussins est de 21 jours et, à partir du 18e jour, il ne faut plus toucher les œufs ni ouvrir l'incubateur.**


**Les œufs de cane ont besoin de 28 jours pour incuber; il faut les humecter d'eau deux fois par jour pendant les 14 derniers jours.**

## **Mirage des œufs**



**Il se peut qu'on mette des œufs à incuber et que, malgré tous les soins, il n'y ait pas éclosion de poussins parce que les œufs n'étaient pas fécondés. Pour éviter cela, vous devez vérifier les œufs. Mettez à l'intérieur d'une petite boîte une ampoule électrique, une lampe de poche ou une autre source lumineuse. Si vous tenez l'œuf entre la lumière et vous (ou à contre-jour par fort ensoleillement), vous pourrez voir s'il est fécondé ou non.**


### Mirage des œufs



**Il vous faudra vérifier les œufs:**

- **Avant de les placer dans l'incubateur.**
- **Sept jours plus tard.**
- **Le 18<sup>e</sup> jour de l'incubation.**

## Mirage




### **Couveuse (pour élever les très jeunes oiseaux)**

**Si vous achetez de jeunes oiseaux ou si vous les faites éclore dans un incubateur, vous devrez les élever dans une couveuse pendant quelques semaines. Vous pouvez acheter une couveuse ou en fabriquer une.**

**Les couveuses ont une source de chaleur pour remplacer la chaleur que les poussins obtiendraient de leur mère. Dans la couveuse, les poussins sont protégés contre les animaux et les intempéries.**

**On peut fabriquer une couveuse simple avec une boîte ou un panier solide, la source de chaleur étant constituée par une lampe-tempête (lampe à pétrole). Une couveuse de 1 m<sup>2</sup> pourra contenir 25 poussins. La lampe doit être grillagée pour empêcher que les poussins ne la touchent. Il faut placer dans la couveuse des auges contenant la nourriture et l'eau; les poussins doivent rester en couveuse jusqu'à ce qu'ils soient âgés de 4 semaines.**

## Couveuse



**Quand les oiseaux atteignent l'âge de 4 semaines, ils n'ont plus besoin de la chaleur d'une lampe et sont trop grands pour rester dans la couveuse. Il faut les placer dans un enclos grillagé avec une boîte tapissée de foin, de paille, de papier ou de carton. Ils pourront aller dans la boîte pour s'y réchauffer s'ils en ont besoin.**


### **Abreuvoirs**

**Les oiseaux boivent beaucoup d'eau; par temps chaud, ils peuvent boire jusqu'à un demi-litre par jour. Les auges contenant l'eau doivent être propres, et les oiseaux ne doivent pas pouvoir y pénétrer. Vous pouvez acheter des auges ou**

**recouvrir de grillage un récipient approprié. On peut aussi distribuer l'eau à partir d'une bouteille fixée au-dessus d'un récipient.**

**Les canards ont besoin d'assez d'eau pour pouvoir y plonger la tête. Ils éclaboussent beaucoup, ce qui peut causer des problèmes. Si on place le récipient d'eau pour canards dans un cadre en bois muni d'un grillage, cela empêche les oiseaux d'atteindre le sol boueux.**

### Abreuvoirs



Auge

### Auges à nourriture


**Les auges à nourriture ou mangeoires peuvent être achetées ou fabriquées avec du bois. Elles doivent être assez grandes pour que tous les oiseaux puissent s'y nourrir.**

**Une bonne mangeoire pour poulets se compose d'une base en bois avec un perchoir de chaque côté pour que les volailles puissent s'y tenir en mangeant. La**

hauteur de l'auge varie selon l'âge des oiseaux. On dispose au-dessus de l'auge une perche qui tourne sur elle-même si un oiseau essaie de s'y percher.

Pour se nourrir, les canards ont besoin d'auges peu profondes ou de récipients plats.

### Auges à nourriture



### Module 54: La couvaison

*Quand l'oiseau femelle s'assoit sur ses œufs dans un nid pour les incuber, on dit qu'elle les couve.*

*L'incubation naturelle ou couvaison est le moyen le plus simple de faire éclore un*

***petit nombre d'œufs. Une poule couveuse incubera ses propres œufs ou ceux d'une autre poule ou d'une cane.***

***Il arrive que des couveuses se refusent à quitter les œufs pour manger ou boire. Elles peuvent être atteintes de parasites externes (par exemple des acariens ou des puces). Il faut veiller à nourrir la poule et la traiter pour ces parasites.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**


- 1 Reconnaître si une poule demande à couvrir.**
- 2 Utiliser la poule couveuse pour incuber des œufs de poule ou de cane.**
- 3 Soigner la poule couveuse.**

## **La poule couveuse**

**Il se peut que des poules de race nouvelle ne soient pas de bonnes couveuses. Comme épreuve pour vérifier si une poule est une bonne couveuse, on peut placer quelques balles blanches ou quelques œufs durs dans son nid pendant un ou deux jours. Si la poule reste au nid et se refuse à bouger, remplacez ces balles ou ces œufs par 10 à 15 œufs fécondés qui ont été mirés (voir module 53).**

**L'incubation naturelle est le moyen le plus simple de faire éclore un petit nombre d'œufs. La poule couveuse peut être utilisée pour incuber et faire éclore ses propres œufs ou ceux d'un autre oiseau. Une poule peut couvrir de 12 à 15 œufs de poule, ou peut être utilisée pour couvrir jusqu'à 10 œufs de cane.**

## La poule couveuse



**La poule couveuse est placée dans un pondoir. Retirez-la du nid pendant 20 minutes chaque jour pour la nourrir et la faire boire. Si une poule a l'habitude de couvrir des œufs de cane, vous devrez les humecter d'eau pendant les 14 derniers jours de la période d'incubation.**

**Une poule peut aussi couvrir des œufs de dinde. Une dinde peut pondre jusqu'à 15 œufs, mais une poule couveuse ne pourra faire incuber que 9 œufs de dinde au maximum.**

### **Soin des poules couveuses**

**Pour s'assurer que la poule couveuse n'a pas de parasites externes (module 56), il faut la traiter avec une poudre appropriée (voir R15, annexe 1) avant de la placer dans le nid. Il faut aussi saupoudrer légèrement les matériaux utilisés pour le nid. On empêchera ainsi tous parasites éventuels d'être transmis aux poussins. S'il y a des trous dans la boîte il faut les obturer pour empêcher les rats d'atteindre les œufs et de les dévorer.**

**La diarrhée blanche tue un grand nombre de volailles. Ne faites pas éclore les œufs d'oiseaux qui ont été infectés par cette maladie. Le germe qui cause la maladie sera dans les œufs et infectera les poussins. Consultez votre service vétérinaire au sujet de cette maladie dans votre région.**

### **Module 55: Les parasites internes des poulets et des canards**

***L'intestin des poulets et des canards peut être infecté par différents nématodes. Les infections graves provoquent une perte de poids et de la diarrhée; la production d'œufs est médiocre.***

***Le ver de l'acuariose, qui est mince et rouge, vit dans la paroi du gésier des canards; il entraîne une perte d'appétit, une perte de poids, de la diarrhée et la mort des oiseaux.***

***Les poulets et les canards peuvent être infectés par de très petits parasites, appelés coccidies, qui vivent dans la paroi de l'intestin. Ces parasites provoquent la diarrhée et une perte de poids; ils peuvent entraîner la mort d'un très grand nombre de jeunes oiseaux.***



## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quels sont les problèmes causés par les infections vermineuses des poulets et des canards.**
- 2 Quels sont les problèmes causés par les coccidies chez les poulets et les canards.**
- 3 Comment traiter les oiseaux infectés.**
- 4 Quels sont les moyens de prévention des infections parasitaires des oiseaux.**

### **Vers parasites des poulets et des canards**

**Les poulets et les canards sont infectés par des vers se trouvant dans le sol, la nourriture ou l'eau contaminés par des œufs de vers. Les œufs de vers survivent dans un milieu chaud et humide.**

**On trouve dans l'intestin un gros nématode blanc (10 cm de long). De petits vers de la trichostrongylose, très fins, vivent dans les parois de l'intestin. On peut trouver d'autres vers, d'environ 1 cm de long, dans la partie inférieure de l'intestin.**

- Les infections vermineuses sont de la plus haute importance chez les jeunes oiseaux et provoquent une perte d'appétit, une perte de poids et de la diarrhée. Les infections prononcées peuvent entraîner la mort. Chez les oiseaux plus âgés, on constate une perte de poids et une production d'œufs défectueuse.**

- **Le ver de l'acuariose provoque une perte d'appétit, une perte de poids et de la diarrhée; il peut entraîner la mort des canards, surtout des sujets jeunes.**

## **Coccidie des poulets et des canards**

**On ne peut pas voir la coccidie sans microscope. De nombreuses coccidies différentes infectent les diverses régions de l'intestin, aussi bien chez les poulets que chez les canards. Normalement, les oiseaux sont infectés par un certain nombre de coccidies différentes.**

**Les oiseaux sont infectés par le sol, la nourriture ou l'eau contaminés, mais ils n'auront que peu de problèmes si l'infection est bénigne. Les jeunes oiseaux, en particulier ceux qui ont moins de 1 mois, peuvent être sérieusement atteints. Ils ont la diarrhée, et la fiente peut être sanguinolente. Les coccidies peuvent tuer les jeunes volailles dans les deux semaines qui suivent l'apparition de la maladie.**

### **Coccidie des poulets et des canards**

***La coccidiose est dangereuse pour les poussins. Consultez votre vétérinaire au sujet de cette maladie car elle peut tuer tous les jeunes oiseaux de votre élevage.***

## **Traitement des infections parasitaires des oiseaux**

**On peut tuer les vers en traitant l'oiseau avec un anthelmintique approprié (voir R14, annexe 1). La tétramisole ou la lévamisole tuent tous les vers. Les oiseaux sont traités séparément, ou bien les médicaments sont mélangés à la nourriture ou à l'eau. Les coccidies sont combattues par plusieurs médicaments (voir R18,**

**annexe 1) qu'on ajoute à l'eau de boisson ou à la nourriture.**

## **Prévention des infections parasitaires chez les poulets et les canards**

**On peut maîtriser l'infection due à tous les parasites internes aussi bien chez les poulets que chez les canards en veillant à la propreté des oiseaux et en les empêchant de divaguer librement.**

- **Les cages et les poulaillers doivent être maintenus propres, la fiente étant évacuée chaque semaine.**
- **Les auges à nourriture et à eau doivent être nettoyées chaque jour.**
- **Ne laissez pas se former des flaques boueuses autour des auges à eau ou ailleurs.**
- **Il faut nettoyer les cages et les poulaillers de façon approfondie avant d'y placer de nouvelles volailles.**
- **Ne laissez pas la volaille sur le même terrain, année après année, car la contamination du sol augmentera.**
- **Il faut séparer les jeunes oiseaux des oiseaux plus âgés.**
- **Ne placez pas les jeunes oiseaux, en particulier ceux qui ont moins de 3 mois, dans un enclos où se trouvaient récemment des volailles plus âgées car ils risqueraient d'acquérir une infection à coccidies.**

- **Si possible, traitez les jeunes oiseaux régulièrement pour combattre les coccidies (demandez conseil à votre vétérinaire).**

***Quand vous achetez de nouveaux oiseaux, demandez à votre vétérinaire ou à votre vulgarisateur agricole quels sont les marchands qui vendent des oiseaux en bonne santé qui ne transmettront pas de maladie à la volaille de votre communauté.***

## **Module 56: Les parasites externes des poulets et des canards**

***Un certain nombre de poux et d'acariens infectent les oiseaux et provoquent une vive irritation qui aboutit à la perte de plumage, à une perte de poids et à une diminution du nombre d'œufs.***

***De petites tiques se nourrissent du sang des oiseaux et peuvent transmettre des germes qui causeront d'autres maladies.***

***Les parasites externes se dissimuleront dans les parois, le sol et la litière des cages et des poulaillers. Pour combattre les parasites, il faut tenir ces endroits propres et tuer tous les parasites qui s'y trouvent.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez connaître:**

- 1 Les acariens, les puces et les poux qui infectent les poulets et les canards.**
- 2 Les problèmes causés par les infections dues aux puces, aux poux et aux acariens.**

**3 Les infections dues aux tiques des poulets et des canards, et les problèmes qu'elles causent.**

**4 Le traitement des oiseaux infectés.**

**5 Les règles d'hygiène pour tenir les poulaillers et les cages propres et exempts de parasites.**

## **Puces, acariens et poux infectant les poulets et les canards**

### **Puces**


**Les puces sont petites et de couleur foncée; elles peuvent sauter très haut. Elles se nourrissent de sang et peuvent se passer de nourriture pendant longtemps. On trouve les œufs et les larves des puces dans les nids des oiseaux et dans les fissures des parois et du sol des bâtiments.**

**On trouve sur les caroncules et la crête des coqs un certain type de puce qui ne saute pas. Sa morsure provoque des ulcères. Quand ces puces sont nombreuses, elles peuvent tuer de jeunes oiseaux. Elles infectent aussi les canards; on les trouve autour des yeux. Enfin, ces puces peuvent mordre les gens.**

### **Acariens**

**Un certain nombre de différents acariens infectent les oiseaux, provoquant de l'irritation et une chute des plumes. L'acarien de la gale des pattes peut provoquer une boiterie. Le dermanyssus (acarien rouge) peut tuer les oiseaux et il mord aussi les gens.**

## **Acariens**



## **Poux**

**Les poulets peuvent être infectés par un certain nombre de poux qui sucent le sang et mordent la peau. Les canards peuvent aussi être atteints d'infections dues aux poux. Ces parasites peuvent s'attaquer à toutes les parties du corps; on les trouve sur la peau et dans le plumage.**

**Les infections dues aux poux causent de l'irritation et empêchent les oiseaux de se reposer, de dormir et de se nourrir correctement. Les oiseaux perdent du poids et la production d'œufs diminue. Une chute des plumes peut se produire chez les poulets.**


**Chez les canards, l'infection due aux poux peut endommager le plumage à tel point**

**que les oiseaux meurent de froid.**

## **Infections dues aux tiques des poulets et des canards**

**Les poulets et les canards peuvent être attaqués par une petite tique bleuâtre ou brunâtre appelée tique de la poule. On la trouve dans les fissures des murs ou des arbres, et elle peut vivre plusieurs années sans se nourrir du sang d'un oiseau. La tique se nourrit la nuit et peut provoquer l'arrêt de la ponte. Elle est la cause de la paralysie due aux tiques chez les canards et elle propage d'autres infections.**

## **Infections dues aux tiques des poulets et des canards**



## **Comment traiter les oiseaux infectés**

**Pour combattre les parasites externes, il faut traiter les oiseaux avec une poudre ou une pulvérisation contenant par exemple du trichlorphon ou du malathion (voir R15, annexe 1). Les enclos grillagés et les poulaillers doivent être nettoyés à fond.**

**Les poulets se nettoient le plumage tous les jours avec de la terre ou du sable (bain de poussière). Si on dispose d'une boîte peu profonde contenant du sable et des cendres, les oiseaux l'utiliseront, ce qui maintiendra leur plumage propre et exempt d'infection. Le bain de poussière sera encore plus utile avec un léger épandage d'une poudre spéciale (voir R15, annexe 1).**

### **[Comment traiter les oiseaux infectés](#)**

**On peut traiter la gale des pattes des poulets en plongeant la patte dans du pétrole, puis en la brossant légèrement. Il ne faut pas que le pétrole touche la peau ou les plumes.**

### **Nettoyage des cages et des poulaillers**

**Si la volaille est infectée par des parasites externes, il faudra nettoyer de façon approfondie les enclos grillagés et les poulaillers. On devra sortir toute la litière et évacuer les souillures, puis bien brosser à l'eau chaude et au savon toutes les parties du matériel. Si possible, vous devrez ensuite enduire le matériel d'un mélange de pétrole et de créosote en quantités égales ou de sulfate de nicotine (40 pour cent). Votre service vétérinaire vous indiquera ce qui est disponible sur place.**

**Vous pouvez utiliser une pompe manuelle pour pulvériser les poulaillers. Vous pouvez procéder à des pulvérisations pour le traitement des parasites externes.**



## Votre vétérinaire vous conseillera à ce sujet.

### ***Rappelez-vous ceci:***

***Certains parasites externes des poulets et des canards peuvent mordre les êtres humains en provoquant une irritation et des éruptions cutanées, surtout chez les enfants.***

***Les oiseaux infectés doivent être traités, et il faut nettoyer à fond et pulvériser les endroits où ils sont élevés pour tuer tous les parasites qui s'y trouvent.***

***Demandez conseil à votre vétérinaire car les parasites externes peuvent poser un grave problème pour l'aviculture.***



---

## Chapitre 7: Chameaux, lamas et alpagas

---

[Module 57: Chameaux, lamas et alpagas](#)

[Module 58: La détermination de l'âge du chameau d'après sa denture](#)

[Module 59: La reproduction chez le chameau](#)

[Module 60: La lactation et les soins au jeune chameau](#)

[Module 61: Alimentation et abreuvement des chameaux](#)

[Module 62: Le surra des chameaux \(trypanosomiase\)](#)

[Module 63: Les parasites internes des chameaux](#)

[Module 64: Les maladies cutanées des chameaux](#)

[Module 65: Les problèmes de pied chez les chameaux](#)

---

## **Module 57: Chameaux, lamas et alpagas**

***Les chameaux vivent en Afrique et en Asie. Ils peuvent vivre dans des zones arides où il n'y a que peu de fourrage et d'eau. La plupart sont des dromadaires à une seule bosse, mais dans les régions septentrionales, froides et arides, on trouve des chameaux à deux bosses.***

***Les chameaux sont utilisés pour leur viande, leur lait, les fibres (la laine et le poil), ainsi que pour le transport et d'autres travaux, et leurs excréments servent de combustible. Le chameau fournit tout dans le désert.***

***Les lamas et les alpagas sont de petits animaux assez semblables aux chameaux qui vivent dans les régions montagneuses froides et arides d'Amérique du Sud. Ils sont élevés pour leur viande et leur laine. Le lama est aussi utilisé comme bête de somme (pour porter les fardeaux).***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

#### **1 A quoi servent les chameaux.**

## **2 A quoi servent les lamas et les alpagas.**

### **3 Comment élever des lamas et des alpagas.**

#### **Le chameau**

**Les chameaux ne coûtent pas cher à élever car ils se nourrissent d'aliments durs et épineux, par exemple de buissons, que d'autres animaux ne peuvent pas manger. S'ils sont bien nourris et élevés dans de bonnes conditions, ils sont rarement malades.**

**Les chameaux sont utilisés pour le transport des hommes et des marchandises et pour les travaux agricoles. Dans certaines régions, on les élève pour leur lait car les chamelles peuvent produire plus de lait à partir d'un fourrage médiocre que d'autres bêtes laitières. La viande de chameau est consommée et on utilise les fibres (la laine et le poil). De nos jours, dans certaines régions, l'os de chameau est utilisé pour l'artisanat.**

#### **Les alpagas et les lamas**

**La laine très fine de l'alpaga est utilisée pour fabriquer des vêtements, et ces animaux sont tondus chaque année. Il existe deux types d'alpagas:**

- Le Suri, dont la laine est longue et fine; chaque animal en produit environ 2,5 kg.**
- Le Huacayo, dont la laine est plus courte; chaque animal en produit de 2 à 3,5 kg.**

**La laine du lama est grossière; on s'en sert pour fabriquer par exemple du cordage**

**ou des sacoches de selle. Le lama est tondu tous les deux ans et fournit environ 3,5 kg de laine. Les lamas sont utilisés comme bêtes de somme et peuvent transporter des fardeaux pesant jusqu'à 30 kg, en parcourant de 15 à 20 km par jour.**

### **L'élevage des lamas et des alpagas**

**Ces animaux peuvent se reproduire à l'âge de 1 an, mais il est préférable de les accoupler pour la première fois quand ils sont âgés de 2 ou 3 ans. On élève ensemble les mâles et les femelles. La femelle met bas pendant la saison des pluies, de décembre à mars, et elle entre en chaleur immédiatement après la mise bas.**

**Les lamas peuvent brouter l'herbe et les arbustes, mais les alpagas ne broutent que l'herbe. Les uns et les autres se conduisent comme les ovins et les bovins, et ils ont besoin d'eau tous les jours. Les alpagas et les lamas défèquent au même endroit; leurs excréments sont séchés et utilisés comme combustible. Les maladies des lamas et des alpagas sont les mêmes que celles des chameaux et des ruminants. Il s'agit notamment des maladies suivantes:**

- **La gale, la paralysie des tiques et la teigne (voir module 64).**
- **La fièvre aphteuse et la peste bovine (voir module 75).**
- **La rage transmise par les chiens ou les renards (voir module 78).**
- **L'hydatidose (voir module 80).**

***Les modules qui suivent (modules 58 à 65) traitent du chameau, mais le lama et l'alpaga y sont également mentionnés.***

## Module 58: La détermination de l'âge du chameau d'après sa denture

***Ce n'est pas une tâche simple que de déterminer l'âge d'un chameau. On peut déterminer l'âge du chameau jusqu'à l'âge de 7 ans, tandis que pour le lama et l'alpaga on peut le faire jusqu'à l'âge de 5 ans.***

***Le chameau a 22 dents de lait et 34 dents permanentes. Il diffère des autres ruminants en ce sens qu'il possède 2 incisives à la mâchoire supérieure. Les chameaux ont aussi une paire de canines à la mâchoire supérieure et à la mâchoire inférieure qui leur servent à broyer les plantes ligneuses dont ils se nourrissent.***

***La première paire de molaires permanentes est distincte des autres dents et de couleur foncée.***

### Objectifs d'apprentissage

Après avoir étudié ce module, vous devez pouvoir:

- 1 Reconnaître les dents de lait des chameaux.
- 2 Reconnaître les dents permanentes des chameaux.
- 3 Déterminer l'âge d'un chameau d'après sa denture.
- 4 Déterminer l'âge d'un lama ou d'un alpaga d'après sa denture.

Les dents provisoires (dents de lait) du chameau


Le chameau a 22 dents de lait disposées comme suit:

<b>Mâchoire supérieure:</b>	<b>1 incisive de chaque côté</b>	<b>2</b>
	<b>1 canine de chaque côté</b>	<b>2</b>
	<b>3 molaires de chaque côté</b>	<b>6</b>
<b>Mâchoire inférieure:</b>	<b>3 incisives de chaque côté</b>	<b>6</b>
	<b>1 canine de chaque côté</b>	<b>2</b>
	<b>2 molaires de chaque côté</b>	<b>4</b>

### Détermination de l'âge des chameaux d'après les dents de lait

<b>(1) Nouveau-né</b>	<b>11 n'y a pas de dents.</b>	
<b>(2) A 1 mois</b>	<b>Mâchoire supérieure:</b>	<b>2 molaires de chaque côté</b>
	<b>Mâchoire inférieure:</b>	<b>1 molaire de chaque côté, 2 incisives</b>
<b>(3) A 3 mois</b>	<b>Mâchoire supérieure:</b>	<b>1 canine, 3 molaires de chaque côté</b>
	<b>Mâchoire inférieure:</b>	<b>3 incisives, 1 canine, 2 molaires de chaque côté</b>
<b>(4) A 6 mois</b>	<b>Mâchoire supérieure:</b>	<b>1 incisive, 1 canine, 3 molaires de chaque côté</b>
	<b>Mâchoire inférieure:</b>	<b>3 incisives, 1 canine, 2 molaires de chaque côté</b>

### Détermination de l'âge des chameaux d'après les dents de lait



## Les dents permanentes

Il y a 34 dents permanentes. Elles sont plus grandes que les dents de lait et disposées comme suit:

<b>Mâchoire supérieure:</b>	<b>1 incisive de chaque côté</b>	<b>2</b>
	<b>1 canine de chaque côté</b>	<b>2</b>

	<b>6 molaires de chaque côté</b>	<b>12</b>
<b>Mâchoire inférieure:</b>	<b>3 incisives de chaque côté</b>	<b>6</b>
	<b>1 canine de chaque côté</b>	<b>2</b>
	<b>5 molaires de chaque côté</b>	<b>10</b>

## Détermination de l'âge des chameaux après l'âge de 1 an

- A 1 an** Mâchoire supérieure: 4 molaires de chaque côté
- Mâchoire inférieure: 3 molaires de chaque côté
- A 2 ans et 6 mois** Mâchoire supérieure: 4 à 5 molaires de chaque côté
- Mâchoire inférieure: 3 à 4 molaires de chaque côté
- A 3 ans** Mâchoire supérieure: 5 molaires de chaque côté
- Mâchoire inférieure: 4 molaires de chaque côté
- A 4 ans et 6 mois** Apparition des premières incisives permanentes

## **A 5 Les molaires provisoires sont remplacées par des dents permanentes; 2**



ans sont remplacées de chaque côté de la mâchoire supérieure et 1 de chaque côté de la mâchoire inférieure

A 5 2 incisives permanentes de plus à la mâchoire inférieure

ans et  
6 mois

Mâchoire supérieure: 6 molaires de chaque côté

Mâchoire inférieure: 5 molaires de chaque côté


A 6 Mâchoire supérieure: 1 incisive et 1 canine permanente apparaissent de chaque côté

Mâchoire inférieure: apparition des canines permanentes

A 7 ans Série complète de dents permanentes

*Les premières molaires sur chaque mâchoire sont noires*

Détermination de l'âge des chameaux après l'âge de 1 an



1 an



2 ans et




3 ans



6 mois


4 ans et 6 mois




5 ans




5 ans et 6 mois



6 ans



7 ans



**Dents de lait****Dents permanentes**

**Les canines apparaissent à l'âge de 6 ans et sont très grandes dès l'âge de 7 ans. A la mâchoire supérieure, ces dents peuvent avoir 4 cm de longueur. Certains chameliers coupent les canines de la mâchoire inférieure. Les chameaux peuvent vivre une quarantaine d'années, mais à partir de l'âge de 15 ans ils auront du mal à manger des fourrages durs car les incisives s'usent et commencent à s'écarter.**

**Détermination de l'âge des lamas et des alpagas**

**Il est difficile de déterminer l'âge des lamas et des alpagas après 5 ans. Ces animaux ont 32 dents permanentes. Les premières molaires permanentes apparaissent à l'âge de 6 à 9 mois et une autre paire fait son apparition dès l'âge de 2 ans. Les premières incisives permanentes apparaissent à l'âge de 2 ans, les suivantes à l'âge de 3 ans et la dernière paire entre 3 et 6 ans.**

**Module 59: La reproduction chez le chameau**

***Contrairement à d'autres animaux, la chamelle ne met bas que tous les deux ans.***

***A l'époque de la reproduction, le mâle est en rut; il devient agressif et dangereux.***

**Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez pouvoir reconnaître:**

**1 Le rut chez le chameau mâle.**

- 2 La chaleur (œstrus) chez la chamelle.**
- 3 La gestation chez la chamelle.**
- 4 La mise bas (parturition) chez la chamelle.**

## **Le rut chez le chameau mâle**

**Le chameau mâle parvient à maturité et peut s'accoupler à l'âge de 6 ans. L'accouplement a lieu à l'époque de la reproduction. Cette époque dépend des pâturages disponibles, de la pluie et du froid; elle varie d'une région à l'autre. A l'époque de la reproduction, le mâle et la chamelle deviennent agités et sont difficiles à maîtriser.**

**Les signes du rut chez le mâle sont les suivants:**

- La partie postérieure du palais est poussée en dehors de la bouche comme une boule rose (cela ne se produit que chez le dromadaire à une bosse).**
- Les testicules grossissent.**
- Les glandes sur l'encolure derrière la tête commencent à sécréter une matière brune qui dégage une mauvaise odeur.**
- L'animal écarte ses pattes arrière et se sert de sa queue pour les éclabousser d'urine.**

## **Le rut**



**Pendant le rut, le mâle est difficile à maîtriser et il est dangereux. Il attaque les autres animaux et les gens. Certains chameaux, en particulier de vieux mâles, sont constamment en rut et posent un problème. Il faut châtrer ces animaux. Si le troupeau compte des mâles qui ne sont pas nécessaires pour la reproduction, il faut les châtrer dès leur jeune âge. Demandez à votre vétérinaire de le faire.**

**La chaleur (œstrus) chez la chamelle**

**La femelle est en chaleur pour la première fois à l'âge de 3 à 4 ans. Elle peut continuer à mettre bas jusqu'à l'âge de 20 à 30 ans.**

**La chamelle manifeste le désir de s'accoupler pendant une durée de trois à quatre jours à l'époque de la reproduction. Si elle n'est pas fécondée, elle sera de**

**nouveau en chaleur tous les 28 jours et elle aura cinq périodes de rut à chaque époque de reproduction.**


**Les signes de chaleurs chez la chamelle sont les suivants:**

- **Elle est agitée et se sépare des autres animaux.**
- **Elle s'éclabousse d'urine avec la queue.**
- **La vulve devient humide et tuméfiée.**

**Le coït ou accouplement**

**Le chameau s'accouple avec la femelle quand celle-ci a les quatre genoux à terre. L'accouplement dure de 10 à 20 minutes. Il est préférable d'aider les jeunes mâles sans expérience à pénétrer dans la chamelle.**

**Le coït ou accouplement**



**Habituellement, un mâle s'accouplera avec cinq à sept chamelles, mais les bons sujets pourront s'accoupler avec jusqu'à 70 femelles à l'époque de la reproduction. En une journée, un chameau bon reproducteur peut s'accoupler de deux à trois fois avec jusqu'à trois chamelles.**

## **La gestation**

**Quand une chamelle est gravide, elle fuit tous les mâles qui s'approchent d'elle. Après trois ou quatre mois de gestation, votre vétérinaire sera en mesure de pratiquer un examen interne de la femelle.**

**La gestation dure 390 jours chez le dromadaire et 406 jours chez la chamelle à deux bosses.**

**Si le fourrage est abondant, le jeune chameau peut être enlevé à sa mère à l'âge de 6 semaines; la chamelle pourra de nouveau s'accoupler pour mettre bas l'année suivante. Toutefois, la productivité est faible chez la plupart des chamelles; elles n'ont normalement qu'un petit tous les deux ans.**

## **La mise bas (parturition) chez la chamelle**

**Les signes qui indiquent que la chamelle est sur le point de mettre bas sont les mêmes que chez les autres ruminants. La chamelle devient agitée, elle se sépare des autres animaux et la vulve est tuméfiée. La naissance commence par l'apparition de la poche des eaux, suivie des deux pattes antérieures et de la tête.**

**La taille du chameau nouveau-né dépend de celle de ses parents. En moyenne, il pèse environ 35 kg, et le mâle est plus gros que la femelle. Le chameau qui est né**

**à une époque défavorable (année de sécheresse) pèsera moins qu'un animal né dans de bonnes conditions.**

**La chamelle ne sectionne pas le cordon ombilical avec ses dents, pas plus qu'elle ne lèche et nettoie son petit, mais elle l'aidera à trouver ses trayons pour s'allaiter. La chamelle est une très bonne mère et n'admet pas que quiconque approche de son petit.**

**Si la chamelle perd son petit, elle manifeste une grande détresse. Pour qu'elle continue à produire du lait, il faut prélever la peau du petit mort et l'empailler. La chamelle continuera alors de produire du lait pour son «petit».**

**Ni le dromadaire ni la chamelle à deux bosses n'acceptent de prendre en nourrice un petit chameau orphelin. Celui-ci devra être allaité au biberon. Chez les lamas et les alpagas, la gestation dure environ un an. Le lama, comme l'alpaga, accepte aisément tout jeune animal et le prend en nourrice sans aucune difficulté.**

## **Module 60: La lactation et les soins au jeune chameau**

***Les jeunes chameaux commencent à manger de l'herbe à l'âge de 2 à 3 mois et peuvent être sevrés à 4 mois.***

***Si on laisse le jeune chameau téter au-delà de 4 mois, cela réduit la quantité de lait disponible pour les gens.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module vous devez connaître:**



- 1 La reproduction chez la chamelle.**
- 2 L'importance du colostrum.**
- 3 Le sevrage du jeune chameau.**
- 4 Le rendement et la qualité du lait.**

## **La reproduction chez la chamelle**

**Une chamelle produit normalement un petit tous les deux ans. Cela signifie qu'elle produit en moyenne huit petits pendant sa vie. C'est là un taux de reproduction très faible.**

**Beaucoup de jeunes chameaux meurent avant la naissance ou peu après pour les raisons suivantes:**

- La mère n'a pas été bien nourrie pendant la gestation.**
- Certains chameliers ne laissent pas le petit prendre le colostrum.**
- Le mâle et la femelle étaient peut-être issus des mêmes parents. C'est ce qu'on appelle la consanguinité; elle aboutit chez n'importe quel type d'animal à la production de petits mort-nés ou très affaiblis. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez tenir un registre des mâles utilisés pour la reproduction.**

## **Le colostrum**

**Il est indispensable que le jeune chameau prenne le colostrum de sa mère afin d'être protégé contre certaines maladies. La chamelle produit du colostrum pendant quatre à cinq jours après la naissance.**

**Beaucoup de chameliers ne laissent pas le petit téter librement parce qu'ils pensent que cela provoque chez lui des douleurs abdominales et de la diarrhée. Certains chameliers empêcheront le jeune chameau de prendre le colostrum et il risque ainsi de mourir. Vous devez permettre au jeune animal de prendre le colostrum.**

### **Quand sevrer le jeune chameau**

**Le jeune chameau commencera à manger de l'herbe à l'âge de 2 à 3 mois et il peut être sevré quand il a 4 mois. Beaucoup de chameliers laissent le jeune chameau avec sa mère jusqu'à ce qu'il ait au moins 1 an. S'il est sevré tôt, il faut veiller à ne lui donner que progressivement de la nourriture solide afin d'éviter la diarrhée et aussi de l'empêcher d'acquérir des parasites internes. On emploie deux méthodes pour empêcher le jeune chameau de téter sa mère:**

- **Le pis est recouvert de chiffons maintenus en place par des cordes entourant le dos de la chamelle.**
- **On attache une corde autour du trayon.**

**Cette deuxième méthode n'est pas bonne car elle peut endommager le trayon et provoquer la mammite (maladie du pis).**

### **Le rendement et la qualité du lait**

**Si on laisse le jeune chameau téter sa mère pendant un à deux ans, la quantité de lait disponible pour le propriétaire sera réduite. Si on ne lui permet pas de téter quand il le veut, on peut traire la chamelle, et le jeune animal pourra être**

**progressivement sevré pour manger des aliments solides. Un jeune chameau auquel on permet de téter chaque fois qu'il le désire engraisse et peut éprouver de la difficulté à marcher. De plus, il souffrira quand on l'enlèvera finalement à sa mère.**

**La chamelle peut produire du lait pendant 9 à 18 mois. Le lait de chamelle contient les protéines, les sucres, les graisses, les minéraux et les vitamines dont le jeune animal a besoin, et c'est un aliment précieux pour l'homme.**

**La qualité et la quantité de lait produit par la chamelle dépendront de l'eau et du fourrage disponibles, de la fréquence de la traite et de l'époque à laquelle la chamelle a mis bas. Une chamelle fournira de 4 à 12 kg de lait par jour. Le lait a un goût sucré ou salé selon les plantes dont l'animal se nourrit.**

**Le lait de chamelle est riche en vitamine C; il constitue une source importante de cette vitamine pour les habitants du désert qui ne peuvent pas la trouver dans les fruits et les légumes.**

**Le lait de chamelle est parfois le seul lait disponible dans un milieu désertique où d'autres animaux laitiers ne peuvent pas être élevés. Dans certains pays, les chamelles sont élevées pour leur lait, qui n'est pas seulement utilisé pour la boisson mais peut aussi être transformé en un certain nombre d'aliments. Si on mélange le lait de chamelle au lait d'autres animaux tels que la vache ou la chèvre, il peut servir à fabriquer le fromage, le yaourt et le beurre. On utilise le lait des chamelles à deux bosses pour fabriquer le fromage et le beurre.**

## **Module 61: Alimentation et abreuvement des chameaux**

***Les chameaux peuvent manger des plantes dures et épineuses que d'autres animaux ne peuvent pas consommer.***

***Les chameaux peuvent supporter la soif pendant une très longue période.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quelles plantes et quels fourrages les chameaux peuvent manger.**
- 2 Combien d'eau il faut aux chameaux.**
- 3 Combien de sel il faut aux chameaux.**

## **L'alimentation des chameaux**

**Comme les chèvres, les chameaux peuvent manger les buissons et les branches d'arbres. Comme les bovins et les ovins, ils peuvent aussi paître l'herbe. Le chameau se nourrit de cette façon pendant 8 heures par jour, et il lui faudra de 6 à 8 heures de plus pour ruminer. Les chameaux peuvent être nourris comme les bovins; ils mangent de la paille, du foin, de l'ensilage, du grain et des tourteaux.**

**Le chameau peut manger des plantes épineuses que d'autres animaux ne peuvent pas consommer. Il peut atteindre les branches d'arbres et les buissons jusqu'à une hauteur de 3 m. Le chameau se nourrit de plantes ligneuses en broyant le bois avec ses puissantes canines.**

**Pendant la saison sèche quand le fourrage se fait rare, le chameau peut vivre de la graisse emmagasinée dans sa bosse. Il peut survivre ainsi pendant très longtemps**

**et il perdra du poids à mesure que la graisse est consommée. Pendant cette période, un chameau peut perdre jusqu'à 200 kg.**

**Les chameaux reconnaissent les plantes vénéneuses qui poussent dans leur région et ils refusent de les manger. Toutefois, si le chameau est transféré dans une nouvelle région où l'on trouve des plantes vénéneuses différentes, il risque de les manger.**

## **L'eau**

**Le chameau est bien connu pour son aptitude à résister à la soif et à se passer d'eau pendant longtemps. Il peut le faire pour les raisons suivantes:**

- **La température de son corps peut passer de 34 °C à 41 °C.**
- **Il ne produit que de faibles quantités d'urine et celle-ci est épaisse (concentrée).**

**Si un chameau est élevé près d'un point d'eau ou d'une rivière, il boira chaque jour de petites quantités d'eau. Par temps froid et s'il dispose de fourrage vert, le chameau peut ne pas boire d'eau pendant plusieurs mois parce qu'il retirera des plantes toute l'eau dont il a besoin.**

**Pendant la saison sèche, les chameaux boivent jusqu'à 60 litres d'eau tous les 10 jours. Par temps sec et chaud, un chameau qui a soif peut boire d'un seul coup jusqu'à 200 litres d'eau.**

## **Le sel**

**Le sel est très important pour le chameau. Il a besoin de huit fois plus de sel que les bovins et les ovins. Un chameau a besoin de 1 kg de sel par semaine et il est conseillé de donner du sel aux chameaux chaque semaine.**

## **Module 62: Le surra des chameaux (trypanosomiase)**

***Un chameau bien entretenu et bien nourri ne connaîtra que rarement des problèmes de santé que son propriétaire serait incapable de traiter.***

***Le surra (trypanosomiase) est l'une des maladies des chameaux pour lesquelles une assistance vétérinaire peut s'avérer nécessaire.***

***Vous devrez peut-être demander conseil au vétérinaire au sujet du traitement de la maladie, et il lui faudra prélever des échantillons de sang sur l'animal pour diagnostiquer la maladie.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Ce qu'est le surra.**
- 2 Comment le surra se propage.**
- 3 Quels sont les signes de la maladie.**
- 4 Comment traiter et maîtriser le surra.**

### **Qu'est-ce que le surra?**

**Le surra est une maladie des chameaux très répandue; il porte de nombreux noms**

**différents dans les régions du monde où il sévit. Cette maladie est causée par de très petits parasites, appelés trypanosomes, qui vivent dans le sang de l'animal.**

### **Comment le surra se propage**

**Le surra est transmis par des mouches, par exemple des taons, qui piquent le chameau et propagent les parasites d'un animal à l'autre. Ces mouches ne peuvent pas vivre dans les régions froides ou arides et on les trouve près de l'eau ou des excréments. Il faut tenir les chameaux à l'écart de ces endroits, en particulier quand les mouches sont nombreuses après la pluie.**

### **Les signes de la maladie**

**Tous les chameliers connaissent bien le surra. Les animaux atteints peuvent avoir de la fièvre (voir module 70) et ils ne se nourrissent plus. Ils sont affaiblis, et le ventre et les pattes enflent. Les chammes gravides peuvent perdre leur petit (avorter). Si les animaux ne sont pas soignés, ils peuvent mourir dans les quelques semaines qui suivent l'apparition des premiers signes d'infection.**

**Certains animaux peuvent être malades pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils sont affaiblis et leur bosse devient de plus en plus petite. Ces animaux peuvent avoir des maladies de peau et la plupart souffrent de maladies pulmonaires. Généralement, ils se tiennent debout face au soleil.**

### **Traitement et maîtrise de la maladie**

**Si vous soupçonnez un animal de votre communauté d'avoir le surra, vous devez immédiatement demander à votre vétérinaire de l'examiner. Il prélèvera des**

**échantillons de sang pour vérifier les étalements. Il vous faudra peut-être prélever vous-même des échantillons de sang pour les envoyer à un laboratoire (voir annexe 3).**

**Il existe quelques médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter le surra, par exemple le Naganol et l'Antrycide (voir R17, annexe 1). Le surra étant propagé par des mouches agressives, les chameliers doivent savoir où et quand on trouve ces mouches, et prendre les précautions suivantes:**

- **Déplacements saisonniers des chameaux qui doivent quitter les zones infestées par les mouches.**
- **Déplacements réguliers des chameaux pour éviter l'éclosion des mouches dans les excréments où vivent les larves.**
- **Abreuvement des chameaux aux heures les plus chaudes de la journée quand il y a peu de mouches.**

**Ne traitez pas les chameaux pour le surra s'ils ont absorbé une grande quantité d'eau après une longue période de soif. Traitez-les plusieurs jours après qu'ils ont bu, ou bien ne les laissez pas absorber trop d'eau avant le traitement.**

### **Module 63: Les parasites internes des chameaux**

***Les parasites internes des chameaux sont analogues à ceux des ovins et des bovins.***



***Les chameaux infectés par des parasites internes sont affaiblis; ils manquent d'appétit, peuvent avoir la diarrhée et ne prennent pas de poids. Ce sont les jeunes animaux qui souffrent le plus des parasites.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quels sont les parasites internes des chameaux.**
- 2 Quels sont les problèmes causés par les parasites internes.**
- 3 Comment traiter et combattre les parasites internes.**

## **Les parasites**

**Les chameaux peuvent être infectés par différents nématodes dans l'intestin. Ces nématodes se nourrissent de l'animal. Les chameaux peuvent aussi être infectés par des vers dans les poumons et par des douves (voir module 15) dans le foie.**

**Lors de l'abattage d'un chameau, on peut trouver dans le foie, les poumons et d'autres organes de gros kystes; ce sont des sacs remplis de sérosité. Ces kystes contiennent de nombreux jeunes ténias (voir module 15) qui infecteront les animaux se nourrissant de viande.**

## **Problèmes causés par les parasites internes**

**Les parasites dans l'intestin peuvent provoquer une perte de poids, un affaiblissement et de la diarrhée, et entraîner la mort, surtout chez le jeune animal. Les strongles du poumon provoqueront des problèmes de respiration; on observe**

**chez les animaux affectés une toux sèche et brève.**

**Les kystes de ténia qu'on trouve chez les chameaux se développeront en vers adultes s'ils sont mangés par des chiens, des renards ou des loups.**

**Les kystes endommagent les organes du chameau. Dans le cerveau, les kystes ont pour effet de rendre l'animal incapable de marcher ou de se nourrir correctement. Les animaux infectés tournent en rond; ils peuvent aussi devenir aveugles. Toutefois, le problème principal est que l'homme peut être infecté aussi bien que le chameau (voir module 79).**

**Traitement et lutte contre les parasites internes**

**Les médicaments employés pour traiter les bovins infectés par des parasites internes (voir R11, annexe 1) peuvent aussi être utilisés pour traiter les infections des chameaux.**

**Si un chameau mange de la terre ou croque des os, c'est le signe d'une infection vermineuse de l'estomac. Les vers sucent le sang du chameau et vous devez soigner l'animal immédiatement.**

**Si vous soupçonnez les chameaux dans votre communauté d'avoir un problème de parasites, demandez à votre vétérinaire de vous conseiller le médicament à utiliser.**

**Afin d'empêcher l'infection du chameau par des parasites dans l'intestin ou les poumons, ne le laissez pas paître dans les zones humides autour des points d'eau où s'abreuvent de nombreux animaux. C'est dans ces zones que l'on trouvera les**

**œufs de la plupart des parasites.**

**Si vous découvrez des kystes dans les organes (le foie ou les poumons, par exemple) d'animaux qui ont été abattus pour leur viande, il est préférable de ne pas manger ces organes. Ne les jetez pas au rebut parce que, s'ils sont mangés par des chiens, des renards ou des chats, la maladie se propagera. Vous devrez enterrer tous les organes infectés dans un trou profond ou les brûler, ou encore les placer dans un tonneau à moitié rempli d'eau et de sel. De l'eau très salée tuera les jeunes ténias dans les kystes.**

### **Module 64: Les maladies cutanées des chameaux**

***Les infections de la peau causées par des parasites sont un grave problème chez les chameaux. Les chameaux peuvent être infectés par les tiques et les acariens, et ils souffrent des larves de mouches qui se nourrissent sur les plaies et dans les naseaux.***

***Si elle n'est pas traitée, la gale (infection due aux acariens) peut provoquer la mort du chameau. La gale est très infectieuse et elle vient au second rang après le surra parmi les maladies qui entraînent des pertes de chameaux.***

***Par ailleurs, la gale provoque aussi la perte de laine précieuse chez les lamas et les alpagas.***

### **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez savoir:**

- 1 Quelles sont les maladies cutanées des chameaux.**
- 2 Quels sont les problèmes causés par les maladies cutanées.**
- 3 Comment traiter et maîtriser les maladies cutanées chez les chameaux.**

## **Les infections cutanées des chameaux**

**Les chameaux souffrent d'infections dues à des acariens et à des tiques, ainsi qu'aux larves de mouches qui se nourrissent sur les plaies ouvertes ou vivent dans les naseaux.**

**Les acariens provoquent la gale. Les infections débutent souvent sur l'encolure, la tête ou le ventre de l'animal, mais se propagent rapidement à tout le corps si elles ne sont pas traitées.**

**Les chameaux peuvent être attaqués par de nombreuses tiques différentes. On trouvera habituellement les tiques fixées aux pattes, à la tête et au ventre.**

**Si les plaies ne sont pas soignées, elles s'infectent avec les larves de différentes mouches qui se nourrissent du sang et de la chair. Le chameau est infecté aussi par les larves de la mouche des naseaux. Cette mouche pond ses œufs autour des naseaux du chameau et les larves, qui atteignent une longueur d'environ 1 cm, éclosent et se nourrissent à l'intérieur des naseaux de l'animal.**

**La teigne provoque des dépilations circulaires recouvertes de pellicules farineuses blanchâtres sur la tête, l'encolure et d'autres parties du corps.**

## **La gale du chameau**

**Comme le surra, la gale est chez le chameau une maladie très importante et très infectieuse. Les chameaux sont infectés par contact avec des animaux infectés par les acariens sur les selles et d'autres pièces de harnachement, et aussi quand ils se roulent dans la poussière à la suite d'animaux infectés. L'homme peut lui aussi être infecté par la gale.**

**L'acarien de la gale creuse des galeries sous la peau, provoquant la chute du poil; la peau épaissit et devient blanche. L'infection débute souvent sur la tête ou l'encolure mais, si elle n'est pas traitée rapidement, elle s'étendra au corps tout entier en l'espace de deux à trois semaines. Les animaux infectés se grattent contre tout objet solide et ne mangent pas bien. On constate une perte de poids et une baisse de la production laitière, et les animaux risquent de mourir. Cette infection est plus fréquente par temps froid et quand le fourrage se fait rare.**

**Les infections dues à la gale doivent être traitées rapidement. Si les chameaux dans votre communauté ont la gale, vous devez immédiatement demander conseil à votre vétérinaire qui vous indiquera le médicament à utiliser (voir R15, annexe 1). Le traitement comportera le lavage ou la pulvérisation des régions infectées.**

**Pour éviter la propagation de l'infection, il faut nettoyer à fond, ou même brûler, les selles et autres pièces de harnachement. Votre vétérinaire vous conseillera peut-être de traiter d'autres animaux dans la communauté, même s'ils ne manifestent pas les signes de l'infection. N'oubliez pas que l'homme peut être infecté par l'acarien. Lavez-vous toujours les mains avec soin après avoir manipulé des chameaux.**

**Infections dues aux tiques et moyens de lutte**

## **Les infections dues aux tiques sont très répandues. Elles ont les effets suivants:**

- **Les morsures causent une tuméfaction et de petites plaies sur la peau.**
- **La tique se nourrit de sang, et les infections entraînent une perte de sang, une perte de poids et un affaiblissement de l'animal.**
- **Les tiques peuvent propager d'autres maladies.**
- **Les toxines provenant de certaines tiques affectent le système nerveux et les muscles; l'animal ne peut plus bouger (paralyse), ce qui entraîne sa mort.**
- **Les infections dues aux tiques peuvent provoquer la mort des jeunes chameaux.**

**La paralysie est causée par la morsure de certaines tiques. Le chameau accuse soudain des signes de paralysie et la température de son corps diminue. Les toxines peuvent affecter la respiration; le chameau cesse de respirer et meurt.**

**On tue les tiques au moyen de pulvérisations; on peut aussi les enlever à la main, ou appliquer du pétrole ou une cigarette allumée sur le dos de la tique. Le pâturage tournant permet de combattre les infections (voir module 16). La paralysie peut être causée par la morsure d'une seule tique. L'unique traitement de la paralysie consiste à repérer la tique et à l'enlever. Si on procède ainsi assez rapidement, l'animal pourra se rétablir peu à peu.**

## **Problèmes causés par les larves de mouches**

**Les larves de mouches peuvent empêcher la cicatrisation des plaies, et d'autres germes risquent d'infecter celles-ci. C'est généralement au printemps et en été qu'on observe les larves de la mouche des naseaux chez le chameau. Il y a un écoulement aux naseaux et l'animal peut éternuer. Habituellement, les chameaux ne sont pas sérieusement affectés par les larves, mais ils sont gênés par l'activité des mouches adultes qui essaient de déposer leurs œufs.**

**Il faut retirer les larves des plaies, nettoyer correctement ces dernières et les panser (voir module 73). On peut tuer les larves de la mouche des naseaux en administrant des injections de nitroxylnil (voir R11, annexe 1), mais vous n'aurez besoin de le faire que si votre vétérinaire vous le conseille.**

### **La teigne du chameau**

**La teigne du chameau est analogue à celle d'autres animaux (voir module 16). C'est une maladie infectieuse qui se propage à d'autres animaux et peut infecter l'homme.**

**On soigne la teigne par des applications de teinture d'iode. Vous devez demander conseil à votre vétérinaire. Il prélèvera des raclures de peau pour découvrir si le problème est causé par la gale ou par la teigne. Il conseillera peut-être l'emploi d'autres médicaments s'ils sont disponibles (voir R25, annexe 1).**

### **Module 65: Les problèmes de pied chez les chameaux**

***Le pied du chameau est adapté aux sols sablonneux et peut être décrit comme étant un pneu rempli de graisse et non pas d'air.***

***De nos jours, le chameau se déplace sur des routes à surface goudronnée dure et sur un sol jonché d'objets coupants comme des clous, du fil de fer et des morceaux de verre. Ces objets peuvent blesser le pied, entraînant une boiterie.***

***Les lamas et les alpagas ont deux pinces sur le pied avec des onglons qui poussent comme ceux des ovins et des caprins.***

## **Objectifs d'apprentissage**

**Après avoir étudié ce module, vous devez connaître:**


- 1 La structure du pied du chameau.**
- 2 Les soins à donner au pied du chameau.**
- 3 Le pied du lama et de l'alpaga.**

## **Le pied du chameau**

**Le pied du chameau, plat et mou, est divisé en deux parties. Il y a un onglon à l'extrémité de chaque côté.**

## **Le pied du chameau**





**Les objets coupants, comme les clous, le fil de fer, le verre ou les épines pénètrent dans la sole du pied et causent des plaies. La douleur provoquée par la plaie peut entraîner la boiterie. Parfois, le pied enfle quand l'animal se déplace sur des routes à surface dure.**

**Les plaies simples peuvent être traitées à la teinture d'iode (voir module 73). En cas de boiterie prononcée, vous devez demander conseil à votre vétérinaire pour le traitement.**

**Parfois, on peut recouvrir le pied du chameau d'une toile épaisse ou de cuir pour empêcher la tuméfaction de s'aggraver.**

## Les pieds du lama et de l'alpaga

Le pied du lama et de l'alpaga est divisé en deux parties; chacune comporte un onglon qui pousse comme celui des ovins et des caprins. Pour soigner les pieds du lama et de l'alpaga, vous pouvez utiliser les mêmes outils que pour les pieds des ovins et des caprins. Les onglons de ces animaux peuvent être rognés.

### Les pieds du lama et de l'alpaga



Pied sain



Pied en mauvais état

